

### **FÓRMULA:**

Cada tableta recubierta contiene:

Secnidazol ..... 500 mg

Excipientes c.s.p.

### **INDICACIONES:**

Uretritis y vaginitis causada por *Trichomonas vaginalis*. Giardiasis, amebiasis intestinal y hepática.

### **CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al secnidazol, discrasias sanguíneas, embarazo y lactancia.

### **DOSIS AMIBEST<sup>®</sup> tabletas recubiertas:**

Uretritis y vaginitis causada por *Trichomonas vaginalis*: 4 tabletas (2 g) en una sola toma por la mañana.

Amebiasis intestinal y giardiasis: 2 tabletas (1 g) por la mañana y 2 tabletas (1g) por la noche, en tratamiento de un solo día.

Amebiasis hepática: 3 tabletas (1.5 g) en una sola toma o dividido en varias tomas al día, durante 5 días.

### **PRESENTACIÓN:**

Caja con 8 tabletas recubiertas en blister.

Fabricado en Guatemala por  
**Pharmalat, S. A.** para  
**Winzzer Medical Corporation**  
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito  
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.  
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157  
[www.pharmalat.net](http://www.pharmalat.net)  
[servicioalcliente@pharmalat.com.gt](mailto:servicioalcliente@pharmalat.com.gt)

