



APTIVAL® **ASPARTATO DE ARGININA**

Su médico le ha recetado APTIVAL® solución oral, como un antiasténico el cual le va a ayudar en los casos de fatiga física, sexual y psicológica, embarazo, traumatismo, recuperación postoperatoria, desnutrición crónica del adulto, retardo del desarrollo y personas con dieta vegetariana estricta.

Cada ampolla bebible de 10 mL contiene:
Aspartato de arginina..... 5 g
Vehículo c.s.p.

¿QUÉ ES EL ASPARTATO DE ARGININA?

Es un aminoácido glucogénico esencial el cual elimina el amoníaco (metabolito tóxico) del organismo, así como en la biosíntesis de la creatina, compuesto esencial en el metabolismo energético.

Se ha relacionado su utilización con el aumento de la producción de la hormona del crecimiento y la estimulación de la función del timo, mejorando la respuesta inmunológica. Este aminoácido esencial está involucrado en la biosíntesis de poliaminas (especialmente putrecinas, espermina), las cuales estimulan y estabilizan el ADN, estimulan la biosíntesis del ARN y mejora la calidad y la cantidad del esperma masculino.

INDICACIONES

APTIVAL® ampolla bebible, es un antiasténico por excelencia, incrementa el rendimiento muscular, mejora el sistema respiratorio, cardiovascular y nervioso, causado por cansancio físico, síndrome de fatiga crónica y convalecencia.

PRECAUCIONES

Por su contenido en Aspartato de Arginina, las personas con retención urinaria únicamente podrán administrarlo bajo control médico. No sobrepasar las dosis indicadas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave.

ADVERTENCIAS

Si existe embarazo o sospecha de éste, consulte al médico antes de tomar este medicamento. Las mujeres en período de lactancia no deben utilizar este medicamento sin consultar al médico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

DOSIS

Niños mayores de 12 años y adultos: se recomienda de 1 a 2 ampollas diarias, tomadas en forma pura o diluida con agua o con jugo de frutas, antes de cada comida, siguiendo un tratamiento de tres semanas.

Niños menores de 12 años: por bajo crecimiento, 700 mg/Kg de peso en una sola toma al día por un período de 3 meses.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

La ingestión continuada o accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos). Consultar al médico.

PRESENTACIÓN DE APTIVAL® SOLUCIÓN ORAL

Caja con 10 ampollas bebibles.

APTIVAL®

ES MÁS QUE ENERGÍA

Pharmalat, S. A.
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito, Zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt

