

# Clordiax<sup>®</sup>

## Compuesto

Su médico le ha recetado **Clordiax<sup>®</sup> Compuesto** con la finalidad de aliviar los síntomas de dolor y espasmo en forma de cólico, especialmente si se trata del aparato digestivo, de las vías urinarias o de cuadros espásticos a nivel de los órganos genitales femeninos incluyendo dismenorrea.

**Clordiax<sup>®</sup> Compuesto** controla los síntomas mientras otro producto de elección de su médico combate el origen.

### **¿CUÁL ES LA FÓRMULA DE Clordiax<sup>®</sup> Compuesto?**

Cada tableta recubierta contiene:

Clonixinato de lisina..... 125 mg

Propinox HCl..... 10 mg

**¿CÓMO ACTÚA Clordiax<sup>®</sup> Compuesto?** El propinox HCl proporciona acción espasmolítica específica sobre la musculatura lisa del tracto intestinal, de las vías biliares, urinarias y genitales. El clonixinato de lisina es un potente analgésico que potencializa el efecto del propinox HCl, por lo que consiguen excelentes resultados en los cólicos y cuadros dolorosos espásticos graves. Una gran ventaja de **Clordiax<sup>®</sup> Compuesto** consiste en el gran margen existente entre su acción espasmolítica principal y los efectos secundarios atropiniformes (que contienen atropina) de otros espasmolíticos.

**¿QUÉ CONTRAINDICACIONES TIENE Clordiax<sup>®</sup> Compuesto?** En todos los pacientes hipersensibles a las pirazolonas (todos los medicamentos que contengan metamizol, propifenazona, fenazona, isopropilaminofenazona y fenilbutazona). Además se debe tener precaución en casos de hipotensión arterial e inestabilidad circulatoria. No se recomienda durante el embarazo, la lactancia, ni por tiempo muy prolongado.

**¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDE CAUSAR Clordiax<sup>®</sup> Compuesto?** En raras ocasiones sequedad de la boca, constipación, náusea, vómitos, irritación gástrica, somnolencia.





**¿CUÁL ES LA DOSIS DE Clordiax® Compuesto?** La que su médico le indicó, tomando como base 1 ó 2 tabletas hasta 3 veces al día, de acuerdo al grado de dolor. Es aconsejable no masticar la tableta.

En caso que persistan los síntomas por más de 24 horas comuníquese con su médico, porque quizás sea necesario hacer alguna variante en el uso de este producto o del otro medicamento que tome alternativamente.

**CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE Clordiax® Compuesto?**

Caja x 4 y 10 tabletas y dispensador de 60 carteritas x 4 tabletas cada una.

**CLORDIAX® COMPUESTO LE OFRECE UNA ACCIÓN RÁPIDA Y SEGURA, SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.**

Fabricado en Guatemala, C. A. por:  
**Laboratorio Pharmalat**  
0 Ave. "C" 2-55, Col. Najarito, Zona 6  
Villa Nueva, Guatemala, C. A.  
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157  
[www.pharmalat.net](http://www.pharmalat.net)  
[servicioalcliente@pharmalat.com.gt](mailto:servicioalcliente@pharmalat.com.gt)

