



FLANDOL[®]



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

FLANDOL ADULTOS Y NIÑOS

Cada cápsula contiene:

Cartamina (<i>Carthamus tinctorius L.</i>)	50 mg
Bromelina (<i>Ananas comusus</i>)	50 mg
Conjugado de Curcuminoides (<i>Cúrcuma longa L.</i>)	25 mg
Apigenina (<i>Matricaria recutita</i>)	20 mg
Excipientes c.s.p.	

RECOMENDACIONES DE USO:

Flandol está indicado para pacientes con Inflamación Crónica Estéril, ayuda en la mejora a una respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio, y está generada por los agentes inflamatorios, así mismo cuando ocurre la inflamación en tejidos conectivos vascularizados y surge con el fin defensivo de aislar y destruir al agente dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado. Ayudando así al paciente a aliviar la causa de la inflamación.

FORMA DE USO:

Niños mayores de 14 años y adultos: De 1 a 2 cápsulas al día, de preferencia después de las comidas.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a personas alérgicas a la tartrazina, precaución en pacientes fenilcetonúricos.
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Embarazo y lactancia.

ADVERTENCIAS:

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRESENTACIÓN: Caja por 60 cápsulas.

Manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura menor de 30°C,
protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo ingiere.

Fabricado en Guatemala, C.A., por
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.,
0 Av. "C" 2-55, Colonia Najarito, zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C.A.

PBX: (502) 6628-1100 FAX: (502) 6628-1157/65
contacto@pharmalat.net • www.pharmalat.net

