



Lomzol®

Desparasitante dosis única

Su médico le ha recetado **LOMZOL®** y usted sólo debe seguir sus instrucciones para obtener el resultado deseado. **PHARMALAT** solo desea proporcionar información adicional para que usted se informe exactamente de lo que va a tomar y la razón que tuvo su médico al recetarlo.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE LOMZOL®? Lomzol® es eficaz en el tratamiento de parásitos tisulares como Echinococcus granulosos y Echinococcus multilocularis, causantes respectivamente de la equinococosis quística y de la equinococosis alveolar. También es efectivo en los tratamientos de la neurocisticercosis causada por la infección de Taenia solium.

Se ha mostrado (en ensayos clínicos) que el Albendazol erradica quistes o reduce significativamente el tamaño de los quistes hasta en un 80% de los pacientes con quistes producidos por Echinococcus granulosus.

¿CUÁL ES LA DOSIS DE LOMZOL®? Es efectivo contra los siguientes parásitos, adjuntando la dosificación sugerida que es la misma para niños mayores de dos años y adultos.

TIPO DE PARÁSITO	DOSIS	TIEMPO
Estrongiloides.....	1 tableta ó 10 mL	3-5 días
Tenias.....	1 tableta ó 10 mL	3-6 días
Uncinarias.....	1 tableta ó 10 mL	1 día
Ascaris.....	1 tableta ó 10 mL	1 día
Enterobius.....	1 tableta ó 10 mL	1 día
Tricocefalos.....	1 tableta ó 10 mL	1 día
Giardia.....	1 tableta ó 10 mL	3-5 días
Infestaciones mixtas.....	1 tableta ó 10 mL	3 días

Es recomendable repetir el tratamiento de **LOMZOL®** 6 meses después con la finalidad de romper el ciclo biológico del parásito.



¿CUÁL ES EL MECANISMO DE ACCIÓN DE LOMZOL®? El Albendazol es un carbamato benzoimidazólico con efectos antihelmínticos y antiprotozoarios frente a los parásitos tisulares e intestinales. Lomzol® muestra actividad larvicida, ovicida y vermícida y se cree que ejerce el efecto antihelmíntico inhibiendo la polimerización de la tubulina, causando la disrupción del metabolismo del helminto, incluyendo la disminución de energía que inmoviliza y después mata al helminto sensible.

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE LOMZOL®? Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

No debe administrarse en mujeres embarazadas y niños menores de 1 año.

¿CUÁLES SON LAS REACCIONES ADVERSAS DE LOMZOL®?

Cefalea, alteraciones gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas, vómitos), aumento de leve a moderados de las enzimas hepáticas, alopecia reversible (debilidad capilar y moderada pérdida del cabello), fiebre.

¿CUÁLES SON LAS INTERACCIONES DE LOMZOL®?

Puede interactuar con Cimetidina, Prazicuantel y Dexametasona ya que aumentan los niveles plasmáticos del Albendazol.

Ritonavir, Fenitoína, Carbamazepina y Fenobarbital pueden reducir las concentraciones plasmáticas del Albendazol.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE LOMZOL®? Se presenta en caja de 1 tableta conteniendo 400 mg de albendazol y frasco de 10 mL conteniendo 400 mg de albendazol suspensión.

LOMZOL® posee un agradable sabor a naranja en suspensión y en tableta.

SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.

Fabricado en Guatemala, C.A., por **Pharmalat, S.A.**

0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito, Zona 6

Villa Nueva, Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

www.pharmalat.net

