



Pharmalat

Novezol®

500 mg

Antiprotozoario-Antibacteriano específico

Su médico le ha recetado **NOVEZOL®** por poseer actividad antiprotozoaria y antianaeróbica de una manera rápida en su organismo, que en su fórmula:

Cada tableta recubierta contiene:

Tinidazol.....500 mg
Excipientes c.s.p.

¿CÓMO ACTÚA NOVEZOL®?

Penetra dentro de las células de los microorganismos, lesionando las bandas de ADN o inhibiendo su síntesis, teniéndose resultados iniciales a las 2 horas de su administración.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE NOVEZOL®?

Se puede usar como profiláctico de infecciones post-operatorias, especialmente si se trata de cirugía del colon, gastro intestinal y ginecología. Además está indicado en infecciones intraperitoneales (peritonitis y abscesos), infecciones ginecológicas (endometritis, endometriosis, absceso del tubo ovárico), septicemia bacteriana, infecciones de heridas post-operatorias, infecciones de la piel y del tejido blando, vaginitis no específica, gingivitis aguda ulcerativa, tricomoniasis urogenital, giardiasis, amebiasis intestinal y hepática.

¿QUÉ DOSIS SE RECOMIENDA CON NOVEZOL®?

En infecciones post-quirúrgicas: 4 tabletas 12 horas antes de la cirugía (adultos y mayores de 12 años); en infecciones anaeróbicas: 4 tabletas el primer día y 2 tabletas diarias durante 5 a 6 días. En vaginitis no específica: 4 tabletas en una sola toma durante dos días. En tricomoniasis: 4 tabletas en una sola toma durante 2 días con tratamiento simultáneo de la pareja. En giardiasis: 4 tabletas en una sola toma durante 1 o 2 días y en niños una dosis única de 60 mg por kilo de peso corporal. En amebiasis intestinal: 4 tabletas en una sola toma, durante 2 o 3 días, en algunos casos es necesario repetir la dosis hasta 6 días y en niños 60 mg por kilo de peso corporal durante 3 días. En amebiasis hepática: 4 tabletas en una sola toma durante 6 días y en niños 60 mg por kilo de peso durante 5 días. En el tratamiento de amebiasis hepática puede requerirse adicionalmente de aspiración de pus.





¿QUÉ CONTRAINDICACIONES TIENE NOVEZOL®?

No debe usarse durante el primer trimestre de embarazo y se debe tomar en cuenta el riesgo-beneficio en los siguientes meses, no debe tomarse en pacientes con trastornos neurológicos y en personas sensibles al tinidazol. No se debe usar conjuntamente con bebidas alcohólicas porque puede provocar rubor, dolor abdominal, vómito o taquicardia. Las mujeres no deberían dar lactancia hasta 3 días después de haber terminado el tratamiento.

ADVERTENCIA:

No administrar a personas alérgicas a la tartrazina.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE NOVEZOL®?

Caja con 8 tabletas en blíster.

SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.

Fabricado en Guatemala, C.A., por/Manufactured in Guatemala, C.A., by **Pharmalat, S.A.**
0 Ave. "C" 2-55, Col. Najarito, Zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat
LIDERAZGO DE CALIDAD

