



# Tenoflam<sup>®</sup>

Su médico le ha recetado **TENOFLAM<sup>®</sup>**, que en su fórmula:

Cada tableta contiene:

Tenoxicam .....20 mg

Excipientes c.s.p.

**TENOFLAM<sup>®</sup>** es un potente analgésico antiinflamatorio no esteroideo, que presenta biodisponibilidad completa después de su administración oral, con una vida media extraordinariamente larga de 70 horas y que posee la cualidad de alcanzar concentraciones terapéuticas en el líquido sinovial, lubricante de las articulaciones.

**¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE TENOFLAM<sup>®</sup>?** Es un eficaz y potente agente antirreumático, siendo sus principales indicaciones osteoartritis, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, así como en trastornos musculoesqueléticos agudos por traumatismo, espalda dolorosa (lumbago, ciática), dolor postoperatorio, gota aguda, dismenorrea y cualquier otro estado doloroso de menor intensidad.

**¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE TENOFLAM<sup>®</sup>?** Pacientes que hayan presentado reacciones de hipersensibilidad al ingrediente activo, o hayan presentado reacciones de hipersensibilidad a los salicilatos. Pacientes con historia de enfermedad péptica, úlcera gástrica o duodenal, o cualquier alteración en la función hepática o renal.

**¿CUÁLES SON LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE CON TENOFLAM<sup>®</sup>?** Aunque no se ha comprobado su efecto teratogénico preferiblemente no administrar durante el primer trimestre del embarazo; según estudios recientes no requiere ningún ajuste de su dosificación en personas ancianas aunque se recomienda la observación cuidadosa de estos pacientes para detectar tempranamente efectos secundarios indeseables.

**¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS DE TENOFLAM<sup>®</sup>?** Generalmente es bien tolerado, encontrándose una incidencia de efectos adversos sumamente baja siendo éstos principalmente los asociados al aparato gastrointestinal que incluyen náusea, pirosis, mareos, somnolencia, prurito, eritema, urticaria, desapareciendo los mismos al suspender la administración del medicamento.



En tratamientos prolongados (más de 8 semanas) se ha encontrado elevación transitoria de los valores de las pruebas de disfunción renal (creatinina, nitrógeno de urea) de las pruebas de disfunción hepática (transaminasas y bilirrubina) que vuelven a valores normales rápidamente al suspender la administración del medicamento.

**¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN DE TENOFLAM®?** Por lo general se recomienda un régimen terapéutico de 20 mg (1 tableta) diarios. En casos especiales como cuadro de gota aguda, o en el tratamiento de dolor postoperatorio se recomienda la administración de hasta 40 mg diarios.

**¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE TENOFLAM®?**

Caja con 10 tabletas en blíster.

**SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.**

Fabricado en Guatemala, C. A. por  
**Droguería y Laboratorio Pharmalat S.A.**  
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito, Zona 6  
Villa Nueva, Guatemala, C. A.  
(2 cuadras al Noroeste del Estadio Galcasa)  
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157  
[www.pharmalat.net](http://www.pharmalat.net)



**Pharmalat**  
LIDERAZGO DE CALIDAD