



**Ulcecor**<sup>®</sup>  
ESOMEPRAZOL 40 mg

Su médico le ha recetado **Ulcecor<sup>®</sup> Cápsulas con pellets entéricos**, que en su fórmula cada cápsula contiene:

Esomeprazol ..... 40 mg  
Excipientes c.s.p.

Es un inhibidor de la bomba de protones (IBP) que actúa bloqueando el paso final de la producción de ácido gástrico.

**INDICACIONES:** Está indicado en reflujo gastroesofágico, esofagitis erosiva por reflujo, tratamiento preventivo a largo plazo de recaídas por esofagitis o úlceras gástricas asociadas a *H. pylori*, síndrome de Zollinger Ellison (producción excesiva de ácido gástrico) y protección de desarrollo de úlceras gástricas en pacientes tratados con AINE. En caso de embarazo y lactancia siga las indicaciones de su médico.

**EMBARAZO:** Estudios epidemiológicos indican que no existen efectos fetotóxicos ni malformaciones. Se debe tener precaución cuando se prescriba a mujeres embarazadas.

**LACTANCIA:** Se desconoce si esomeprazol se excreta en la leche materna. No se dispone de información suficiente sobre los efectos de esomeprazol en recién nacidos/niños. Esomeprazol no debe utilizarse durante la lactancia.

**DOSIS:** Adultos y adolescentes desde 12 años de edad, 40 mg de esomeprazol una vez al día, 1 hora antes del desayuno, por el período de tiempo indicado por su médico. La dosis puede ser duplicada en casos de sintomatología severa. Bajo supervisión facultativa.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** Es generalmente bien tolerado, puede provocar ocasionalmente dolor de cabeza, náuseas, estreñimiento, resequedad de la boca, muy eventualmente puede provocar diarrea y urticaria. Usar con precaución si se encuentra tomando alguno de los siguientes medicamentos: Itraconazol, Ketoconazol, Cisaprida y suplementos orales de hierro.

Si usted sufre de hipomagnesemia consulte a su médico inmediatamente. En pacientes para los que se espera que estén en tratamiento prolongado o para aquellos que toman IBP con digoxina o medicamentos que pueden causar hipomagnesemia (p. ej., diuréticos), el profesional sanitario deberá valorar la medida de los niveles de magnesio antes de empezar el tratamiento con IBP y periódicamente durante el tratamiento.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad al medicamento.

**PRESENTACIONES:** Caja con 30 cápsulas.

**SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y  
A CAMBIO OBTENDRÁ EXCELENTE RESULTADOS**

Fabricado en Guatemala, C.A., por: **Pharmalat, S.A.**  
0 Ave. "C" 2-55, Col. Najarito, Zona 6 Villa Nueva, Guatemala, C. A.  
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

[www.pharmalat.net](http://www.pharmalat.net) • [servicioalcliente@pharmalat.com.gt](mailto:servicioalcliente@pharmalat.com.gt)



**Pharmalat**