



Pharmalat

# URICRIS®

ALOPURINOL

Su médico le ha recetado **URICRIS®** que en su fórmula por cada tableta contiene:  
Alopurinol ..... 300 mg  
Excipientes c.s.p.

El cual está indicado en el tratamiento de la gota, ácido úrico y cálculos renales.

### **¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE URICRIS®?**

Está indicado en el tratamiento específico de gota primaria o secundaria, en la reducción de la formación de ácido úrico, en el tratamiento de artritis gotosa crónica, hiperuricemia, manejo de cálculos renales recurrentes mixtos de oxalato de calcio y cálculos renales de ácido úrico. **URICRIS®** es un inhibidor selectivo de las fases terminales de la biosíntesis del ácido úrico (por inhibición de la enzima xantino oxidasa). Se absorbe rápidamente después de su ingestión (30 a 60 minutos) y posee una vida media de dos a tres horas y su excreción se detecta en heces hasta 72 horas luego de su ingestión.

### **¿QUÉ CONTRAINDICACIONES TIENE URICRIS®?**

Pacientes con historia de reacciones de hipersensibilidad al alopurinol; niños y mujeres embarazadas y en período de lactancia.

### **¿QUÉ PRECAUCIONES TIENE URICRIS®?**

Administrar con precaución a pacientes con historial de disfunción renal ya que desarrollan frecuentemente reacciones de hipersensibilidad. En pacientes con historial de cálculos recurrentes en vías urinarias, se puede acelerar al inicio del tratamiento la formación de los mismos por lo cual deben ser evaluados cercanamente por su médico.

### **¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDE PROVOCAR URICRIS®?**

Raramente reacciones de hipersensibilidad, rash cutáneo, prurito, fiebre (3% de los pacientes), malestar y mialgias. Al iniciar el tratamiento se pueden aumentar transitoriamente los valores séricos de ácido úrico por la movilización de las reservas tisulares del mismo, por lo que se aconseja iniciar el tratamiento con una dosificación baja para aumentarla progresivamente hasta alcanzar valores séricos de ácido úrico menores de 6 mg/dL.

### **¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN DE URICRIS®?**


Se recomienda 1 tableta al día de 300 mg.

### **¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE URICRIS®?**

Caja con 30 tabletas.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.





**LA DOSIS UTILIZADA DE ESTE MEDICAMENTO EN DIVERSOS ESTUDIOS CLÍNICOS HAN SIDO MUY VARIADAS, DESDE 500 HASTA 1000 mg TRES VECES AL DÍA, INCLUSO HASTA 4 g DIARIOS POR PERÍODO DE DOS MESES, NO HABIÉNDOSE ENCONTRADO EFECTOS SECUNDARIOS ADVERSOS O INDESEABLES NI SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.**

**SIGA EXACTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ EXCELENTES RESULTADOS. NO OLVIDE LA PRÓXIMA CITA CON SU MÉDICO.**

Fabricado en Guatemala, C.A., por  
**Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.**  
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito  
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.  
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157  
[www.pharmalat.net](http://www.pharmalat.net)  
[servicioalcliente@pharmalat.com.gt](mailto:servicioalcliente@pharmalat.com.gt)



**Pharmalat**

