



Pharmalat

ZANEXIN®

CINARIZINA

Su médico le ha recetado **ZANEXIN®** que es un medicamento formulado a base de 75 mg de Cinarizina por cada tableta, para inhibir la vasoconstricción directa y la inducida por sustancias vasoactivas. **ZANEXIN®** protege a los eritrocitos (glóbulos rojos) contra la pérdida de deformación y por lo tanto reduce un crecimiento anormal en la viscosidad de la sangre, teniendo esta actividad un efecto favorable sobre la microcirculación en el caso de desorden cerebral circulatorio. **ZANEXIN®** actúa en el músculo liso vascular, mejorando selectivamente la irrigación del cerebro, de las extremidades y del vestíbulo del oído.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE COMBATE ZANEXIN®?

- Trastornos de circulación periférica: Que consiste en la frialdad que se produce en las extremidades, acrocianosis (amoratamientos), sensación de hormigueo, desórdenes tróficos y angiopatía diabética.
- Trastornos de circulación cerebral como: Vértigo, cefalea, dificultad de concentración, pérdida de la memoria, secuelas de trauma cerebral y zumbido de oídos.
- Senilidad precoz: Apatía sexual, fatiga, sordera senil, falta de sueño nocturno y despertar prematuro.
- Trastornos del equilibrio: Movimientos involuntarios y dolores de cabeza de origen vascular (jaqueca).

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBEN TOMARSE CON ZANEXIN®?

Puede tomarse conjuntamente con otros medicamentos cuando sea necesario, incluyendo productos para presión arterial y diabetes mellitus. Debe tenerse precaución con productos depresores del sistema nervioso central y no debe usarse durante el embarazo, lactancia, en derrames cerebrales recientes y síntomas extrapiramidales.

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN MÁS APROPIADA?

La que su médico le haya indicado, tomando como base $\frac{1}{2}$ a 1 tableta, 1 ó 2 veces al día especialmente por la noche por un tiempo no menor a 3 meses. Inicialmente puede provocar cansancio o somnolencia, sin embargo estos efectos son pasajeros y desaparecen en la primera semana de tratamiento sin necesidad de reducir la dosis.





¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE ZANEXIN®?

Caja con 30 tabletas en blíster.

PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y ASISTA A SU PRÓXIMA CITA PORQUE ES NECESARIO COMPROBAR SU ESTADO DE SALUD O EN SU DEFECTO REALIZARSE MODIFICACIONES A LA FORMA DE USO DE ESTE MEDICAMENTO.

Fabricado en Guatemala, C.A., por **Pharmalat, S.A.**
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt

