



Molly

PS PHARMA
S I É N T E T E B I E N

Contra la fiebre y el dolor **ACETAMINOFÉN GOTAS** Sabor fresa

Información farmacológica

Composición:

Gotas: Cada mL contiene: Paracetamol (Acetaminofén).....100 mg

Indicaciones y usos: Analgésico y antipirético eficaz contra el dolor leve o moderado causado por afecciones articulares, otalgias, cefaleas, dolor dental, neuralgias, procedimientos quirúrgicos menores, etc. También es eficaz para el tratamiento de fiebre originada por infecciones virales, fiebre post vacunación, etc.

Dosis:

- Niños de 0 a 3 meses: 0.6 mL equivalente a 15 gotas cada 6 horas
- Niños de 4 a 11 meses: 1.2 mL equivalente a 30 gotas cada 6 horas
- Niños de 12 a 23 meses: 1.6 mL cada 6 horas
- Niños de 2 a 3 años: 2 mL cada 6 horas
- Niños de 4 a 5 años: 2.8 mL cada 6 horas

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- Se debe administrar con precaución en pacientes con daño hepático o sangrado del tubo digestivo, no se debe administrar por periodos prolongados.
- En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se debe consultar con el médico antes de utilizarse.

Precauciones generales:

- Si ocurre una reacción rara de sensibilidad, descontinuar el medicamento de inmediato.
- Si la fiebre o el dolor persisten consultar al médico.
- No utilizar dosis mayores a la indicada.

Advertencias: No administrar mas de cinco veces al día la dosis recomendada, ni por mas de cinco días consecutivos a niños, ni por más de diez días consecutivos a adultos. Si persiste el dolor o la fiebre por más de tres días consecutivos, consultar al médico.

Interacciones: La hepatotoxicidad potencial del Paracetamol puede verse incrementada por la administración de grandes dosis o de dosis prolongadas de una serie de sustancias, por inducción de las enzimas microsomales hepáticas. Estos agentes también pueden provocar una disminución en los efectos terapéuticos del Paracetamol. Dichas sustancias son: Barbitúricos, Carbamazepina, Hidantoínas Isoniacida, Rifampicina y Sulfipirazona.

Reacciones adversas: Las reacciones adversas del Paracetamol son por lo general raras o muy raras; entre las que pueden estar, malestar, niveles aumentados de transaminasas hepáticas e hipotensión.

Sobredosis: La sintomatología por sobredosis incluye mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia, dolor abdominal e insuficiencia renal y hepática. Si se ha ingerido una sobredosis debe tratarse rápidamente al paciente al paciente en un centro médico, aunque no haya síntomas o signos significativos, ya que, aunque estos pueden causar la muerte a menudo no se manifiestan inmediatamente después de la ingestión, sino a partir del tercer día. Pueden producirse la muerte por necrosis hepática. Así mismo puede aparecer fallo renal agudo.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Frasco gotero 10, 15, 20, 25 y 30 mL.

Condiciones de almacenamiento:

- Manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz.
- Producto medicinal, mantener fuera del alcance de los niños.

PS PHARMACEUTICAL
0 Av. C 2-55 Col. Najarito Zona 6 Villa Nueva Guatemala,
PBX: (502) 6628-1158