



lza

**PHARMA**  
S I É N T E T E B I E N

Elimina los parásitos  
**ALBENDAZOL**

Sabor naranja | Suspensión oral  
400 mg / 10 mL

#### Información farmacológica

##### Composición: cada 10 mL de suspensión contiene:

Albendazol.....400 mg  
Vehículo c.s.p.

##### Indicaciones y usos:

Albendazol es efectivo para el tratamiento de infestaciones causadas por: *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermicularis*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Hymenolepis nana*, *Taenia sp*, *Strongyloides stercoralis*, *O. viverrini*, *C. sinensis*, larva migrans cutánea y *G. spinigerum*, también tiene actividad contra *Giardia lamblia*.

También está indicado para el tratamiento de la neurocisticercosis parenquimatosa, debida a lesiones activas causadas por formas larvianas del platelminto porcino *Taenia solium*. También es útil para el tratamiento de la enfermedad hidatídica de hígado, pulmones y peritoneo causada por la forma larvaria de la tenia del perro *Echinococcus granulosus*.

##### Dosis:

- Niños mayores de 2 años y adultos: 10 mL de suspensión (400 mg) en una sola toma.
- En estrongliodiasis, *Taenia*, o infecciones por *Himenolepis* se deben emplear 10mL de suspensión en una sola toma por 3 días consecutivos. No es necesario el ayuno ni el uso de purgantes. Siempre consultar a su médico.

##### Agítese bien antes de usar.

##### Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a los compuestos de tipo bencimidazol, o a cualquier componente de la formulación de Albendazol.

##### Advertencias:

- Consulte a su médico antes de iniciar a usar este medicamento si usted está embarazada o sospecha estar embarazada o está en período de lactancia.

##### Precauciones generales:

- Si ocurre una reacción rara de sensibilidad, discontinuar el medicamento de inmediato.
- Los pacientes que están siendo tratados para neurocisticercosis deben recibir la terapia anticonvulsiva y de esteroides adecuada a las necesidades. Se deben considerar los corticosteroides orales o intravenosos para prevenir episodios hipertensivos cerebrales durante la primera semana de tratamiento anticisticercosis.
- La cisticercosis puede, en raras ocasiones, involucrar a la retina. Si se visualizan las lesiones, la terapia en contra del cisticercosis se debe valorar en contra de la posibilidad de daños a la retina, debido a la administración de Albendazol en la lesión de la retina

##### Vía de administración: oral.

##### Presentación:

frasco de 10 mL.

##### Condiciones de almacenamiento:

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura no mayor de 30 °C, protegido de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**PS PHARMACEUTICAL**

0 Av. C 2-55 Col. Najarito Zona 6 Villa Nueva Guatemala,

PBX: (502) 6628-1100