Artrosil® 5

Pharmalat

Su médico le ha recetado **Artrosil® 5** polvo para solución oral, que en su fórmula contiene por cada sobre de 5 gramos:

Glucosamina sulfato	1800 mg
Condroitina sulfato sódico	650 mg
Colágeno hidrolizado	600 mg
Ácido hialurónico	5 mg
Ácido ascórbico	100 mg
Excipientes c.s.p.	

La combinación de estos cinco componentes promueve la salud a largo plazo, a diferencia de otros productos que ofrecen solamente un alivio temporal en las afecciones de las articulaciones. La adición de ácido hialurónico y vitamina C ayudan a obtener mejores resultados.

¿Cómo actúa cada componente de Artrosil® 5?
La glucosamina es un bloque que edifica el cartílago de la articulación, lo cual ayuda a mantener la integridad estructural de las articulaciones y del tejido conectivo; la condroitina forma parte de una molécula proteica grande (proteoglicano) que proporciona la elasticidad al cartílago; el colágeno ayuda a restituir el colágeno propio de las articulaciones perdido a través de los años ya que el cuerpo deja de producirlo a partir de los 35 años, además de ser un reconstituyente de la piel, uñas y huesos; el ácido hialurónico ayuda a compesar las pérdidas de este componente y restaura las propiedades elásticas en las articulaciones y la función de la vitamina C es reparar y mantener el cartílago, además de reparar los tejidos en todas las partes del cuerpo.

¿Cuáles son las indicaciones de Artrosil® 5?
Está indicado en el refuerzo y la lubricación de las articulaciones y como tratamiento de desórdenes reumáticos (artritis reumatoidea y osteoartritis), así como de la osteoporosis y las lesiones deportivas del cartílago, ligamento y tendones.

¿Cuál es la dosificación de Artrosil® 5?
La dosis recomendada en adultos es de 1 sobre al día con algunas de las principales comidas. Se sugiere tomarlo durante 4 a 12 semanas y repetir el tratamiento 2 a 3 veces al año de acuerdo con la evolución de la sintomatología.

¿Cuál es el modo de uso de Artrosil® 5?
Disolver el contenido del sobre (5 g) en un vaso de agua fría o al tiempo o en la bebida de su preferencia.

¿Cuáles son las contraindicaciones de Artrosil® 5?
Hipersensibilidad hacia alguno de los componentes. En el embarazo y la lactancia.

¿Qué efectos secundarios pueden observarse con Artrosil® 5?
Ocasionalmente molestias gastrointestinales leves y transitorias al inicio del tratamiento.

¿Cuáles son las interacciones de Artrosil® 5?
Presenta interacción con los siguientes medicamentos: Acenocumarol, antidiabéticos, cumarinas, warfarina e hidróxido de aluminio.

¿Cuál es la presentación de Artrosil® 5?
Las presentaciones de artrosil son: Caja con 10 sobres y 30 de 5 g cada uno.

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y OBTENDRÁ EXCELENTES RESULTADOS

Fabricado en Guatemala, C. A., por:
Pharmalat, S.A.
0 Ave. "C" 2-55, Col. Najarito, Zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt

Pharmalat