



BIFONADERM[®]

CREMA TÓPICA, SOLUCIÓN TÓPICA

FÓRMULA:

100 gramos de crema tópica contienen:

Bifonazol 1 g

Vehículo c.s.p.

100 mL de solución tópica contienen:

Bifonazol 1 g

Vehículo c.s.p.

INDICACIONES:

Micosis cutáneas provocadas por dermatofitos, mohos, levaduras y otros tipos de hongos en las manos, pies u otras zonas cutáneas.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al ingrediente activo o componentes de la fórmula.

Primer trimestre del embarazo. No debe aplicarse en mucosas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Se debe aplicar una capa fina en el área afectada, con el frotamiento necesario 1 ó 2 veces al día; sin embargo la dosis más adecuada es la que indique el médico. Es recomendable lavar y secar la parte afectada antes de aplicar este producto. El tratamiento se debe continuar hasta 1 semana después de haber desaparecido los síntomas.

ADVERTENCIA:

En caso de reacción de hipersensibilidad suspender el tratamiento y consultar nuevamente al médico.

PRESENTACIONES:

BIFONADERM[®] 1 % crema tópica: Caja con tubo de 15 y 30 gramos.

BIFONADERM[®] 1 % solución tópica: Caja con frasco gotero de 15 y 30 mL.

