



# CLOSTEBOL + NEOMICINA

Crema tópica 30 g



## Información farmacológica:

CLOSTEBOL + NEOMICINA CREMA para sanar enfermedades de la piel y mucosas como dermatosis infectadas, erosiones, úlceras, quemaduras, heridas infectadas, abrasiones, retrasos de la cicatrización, sequedad, fisuración, descamación y radiodermatitis.

### Fórmula: Cada gramo contiene:

Clostebol acetato.....5 mg  
Neomicina sulfato (equivalente a neomicina base).....3.5 mg  
Excipientes c.s.p.

**Mecanismo de acción:** Es una asociación de un esteroide anabólico y un antibiótico; ejerce una acción cicatrizante, acortando el período de reparación de las lesiones cutáneas y mucocutáneas. Contiene en su composición neomicina que actúa sobre el componente infeccioso, el cual retrasa el período de cicatrización de las heridas. La crema es de fácil penetración en la epidermis, presentando un pH ideal para la piel, con la característica de no manchar.

**Dosis:** Aplicar una capa delgada sobre la lesión, 1 ó 2 veces al día.

**Precauciones:** Evitar la aplicación en los ojos, sobre heridas profundas ó quemaduras graves sin prescripción médica. Si la afección no mejora ó empeora tras una semana de tratamiento, se debe consultar al médico.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula y a los derivados de la testosterona. No administrar en caso de infección mamaria y en el período de lactancia, debido al riesgo de ingestión por el recién nacido. En embarazo y lactancia, consultar con el médico.

**Efectos secundarios:** Puede presentarse hipersensibilización en pacientes predispuestos, debido a un uso prolongado. El uso no controlado de la neomicina puede dar como resultado organismos resistentes al medicamento y a otros aminoglucósidos. Puede aparecer eventualmente un dolor local debido al fenómeno de cicatrización.

**Advertencias:** En casos de tratamiento prolongado, como con todo antibiótico local, CLOSTEBOL + NEOMICINA CREMA debe ser usado únicamente bajo vigilancia médica.

**Interacciones farmacológicas:** Cuando se usa junto con otras drogas nefrotóxicas ó que causan ototoxicidad, puede aumentar el riesgo de efectos adversos. No se debe administrar junto con otros aminoglucósidos.

**Vía de administración:** Tópica.

**Presentación:** Crema tópica en tubo de 30g.

### Condiciones de almacenamiento:

Manténgase en un lugar fresco y seco (debajo de 30°C), protéjase de la luz.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.

**PS PHARMACEUTICAL, S.A.**

**0 Av. C 2-55 Col. Najarito Zona 6 Villa Nueva Guatemala, PBX: (502) 6628-1158**