



DICLOFENACO 1% Gel tópico



Información farmacológica

Composición: Cada gramo contiene:

Diclofenaco sódico (Equivalente a 12.5 mg de diclofenaco dietilamonio)..... 10 mg
Excipientes c.b.p

Indicaciones: Este medicamento está indicado en el alivio sintomático local del dolor e inflamación. Diclofenaco Gel Tópico pertenece a una clase terapéutica que se denomina "antiinflamatorios no esteroideos" (AINEs), que son utilizados para aliviar el dolor y reducir la inflamación y edema en varias condiciones dolorosas que afectan las articulaciones y músculos. Diclofenaco Gel Tópico está formulado especialmente para ser aplicado y frotado en la piel.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al Diclofenaco o a cualquiera de los componentes de este medicamento, no utilizar sobre quemaduras solares, no administrar a pacientes que hayan presentado reacciones alérgicas (rinitis, asma, prurito, angioedema, urticaria, shock u otras), provocadas por ácido acetilsalicílico u otros AINEs debido a la posibilidad de hipersensibilidad cruzada, no utilizar durante el último trimestre del embarazo y en período de lactancia, no administrar concomitantemente con otros productos que contengan diclofenaco.

Reacciones adversas: Aunque la posibilidad de efectos adversos sistémicos con diclofenaco tópico es muy pequeña se pueden presentar frecuentemente las siguientes reacciones, como dermatitis (incluyendo dermatitis de contacto), erupción, eczema, eritema y prurito. Reacciones raras, dermatitis ampollosa y reacciones que pueden presentarse muy rara vez, erupción pustular, hipersensibilidad (incluyendo urticaria), angioedema, asma y reacción de fotosensibilidad.

Advertencias: Se debe utilizar sólo en piel intacta, no sobre heridas abiertas, mucosa o piel eczematosa, evitar el contacto con los ojos, no exponer al sol la zona tratada, no ingerir, no utilizar con vendaje oclusivos, no aplicar simultáneamente en la misma zona que otras preparaciones tópicas. No utilizar en áreas extensas. Si los síntomas persisten más de 7 días o se produce irritación o empeoramiento, deberá evaluarse la situación clínica del paciente. Administrar con precaución en pacientes asmáticos o con historial de alergia a colorantes azoicos (tartrazina, etc.).

Interacciones farmacológicas: Hasta la fecha no se ha reportado que Diclofenaco Gel Tópico interfiera con otros medicamentos.

Dosis: El producto puede ser utilizado en adultos y adolescentes mayores de 14 años.
Adultos: aplicar una capa fina del producto en la zona adolorida de 3 a 4 veces al día mediante un ligero masaje para facilitar la penetración. No aplicar mas de 7 días seguidos.

Sobredosis: Debido a su uso externo no es probable que se produzcan cuadro de intoxicación; en caso de ingestión accidental, los síntomas de sobredosis dependerán de la dosis ingerida y el tiempo transcurrido desde la ingestión. Las manifestaciones más frecuentes son: náuseas, vómitos, dolor abdominal y reducción de la consciencia. Tratamiento: si ha transcurrido menos de una hora, realizar vaciado gástrico provocando el vómito o por lavado gástrico. Se administrará carbón activado en dosis repetidas y un purgante salino, para favorecer la excreción no renal del fármaco. Se procederá al mantenimiento de las constantes vitales y tratamiento sintomático de la irritación gastrointestinal.

Vía de administración: Tópica

Presentaciones: Crema tópica en tubo de 5, 10, 15, 25, 30, 50, 100 y 120 g.

Condiciones de almacenamiento:

Manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz.
Producto medicinal, mantener fuera del alcance de los niños.

PS PHARMACEUTICAL
0 Av. C 2-55 Col. Najarito Zona 6 Villa Nueva Guatemala, PBX: (502) 6628-1158