



Nick

Libera las vías respiratorias  
**GUAIFENESINA**  
100 mg/5 mL  
Sabor menta | Solución oral

**Información farmacológica**

**Fórmula: cada 5 mL contienen:**

Guaifenesina.....100 mg  
Vehículo c.s.p.

**Indicaciones y usos:**

Guaifenesina es un expectorante que incrementa el volumen y reduce las secreciones en tráquea y bronquios. Incrementa la eficiencia del reflejo de la tos y facilita la remoción de secreciones. Está indicado como expectorante en el tratamiento sintomático temporal de la tos debido a interacciones leves del tracto respiratorio superior, tales como sinusitis, faringitis y bronquitis, cuando esta se complica con mucosidad viscosa y congestión.

**Dosis:**

- Niños de 7 a 12 años: 1 a 2 cucharaditas (5 a 10 mL) cada 4 a 6 horas.
- Niños mayores de 12 años y adultos: 2 a 4 cucharaditas (10 a 20 mL) cada 4 horas.

**Contraindicaciones:**

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- La Guaifenesina no se considera segura en pacientes con porfiria, ya que en ensayos con animales, su utilización se ha asociado con la aparición de crisis agudas de porfiria.
- Niños menores de 6 años.

**Precauciones generales:**

No utilizar en tos persistente o crónica debida al asma ni cuando va acompañada de secreción excesiva, salvo indicación médica; se debe realizar evaluación clínica si la tos persiste tras 7 días de tratamiento. No utilizar simultáneamente con otros supresores de la tos.

**Advertencias y precauciones especiales de empleo:**

- Consulte a su médico antes de comenzar a usar este suplemento si usted está embarazada o sospecha estar embarazada o está en período de lactancia. Aún no se ha establecido la seguridad de este medicamento para ser utilizado durante el embarazo y lactancia por lo que no se recomienda su uso en estos estados.
- No participar en actividades que requieran estado mental alerta.
- Si se observan las siguientes reacciones adversas se debe consultar al médico: diarrea, mareos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, erupción cutánea, dolor estomacal o urticaria.
- Este medicamento no se debe utilizar para el tratamiento de tos crónica o persistente, como la debida al asma, tabaquismo, bronquitis crónica y enfisema, ni cuando la tos va acompañada de secreción excesiva, salvo mejor criterio médico.
- Se deberá evaluar la relación beneficio riesgo en pacientes con enfermedad renal o hepática grave.
- No se recomienda el uso concomitante de medicamentos supresores de la tos.

**Reacciones Adversas:**

Durante el período de utilización de la Guaifenesina se han comunicado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud:

- Trastornos del sistema inmunológico: reacciones de hipersensibilidad
- Trastornos gastrointestinales: molestias gastrointestinales, dolor de estómago, náuseas, vómitos y diarrea.
- Trastornos del sistema nervioso: dolor de cabeza, mareos. Se ha notificado que en algunos casos se ha producido somnolencia.

En caso de observar la aparición de reacciones adversas se debe notificar a los Sistemas de Farmacovigilancia y si fuera necesario, suspender el tratamiento.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** Frasco de 30, 50, 60, 100, 120 y 240 mL.

**Condiciones de almacenamiento:**

- Manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz.
- Producto medicinal, mantener fuera del alcance de los niños.