



HIDROCORTISONA 0.25%

Crema tópica



Información farmacológica

HIDROCORTISONA 0.25% CREMA para aliviar las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatitis corticosen­sibles, como psoriasis, dermatitis de contacto, dermatitis atópica y dermatitis seborreica.

Fórmula: Cada 100 g contienen:

Hidrocortisona.....0.25 g
Excipientes c.s.p.

Dosis: Aplicar una capa fina de HIDROCORTISONA 0.25% CREMA sobre la piel en las áreas afectadas, 1-2 veces al día ó según criterio del médico. Se recomienda no usar vendaje oclusivo ó cubrir el área afectada, a menos que sea bajo indicación médica.

Precauciones: Se encuentra dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo. Estudios en animales han mostrado un efecto adverso sobre el feto y no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas, sin embargo los beneficios permiten utilizar el fármaco a pesar de sus riesgos potenciales, consultar con el médico antes de su uso. No se conoce sí los corticosteroides tópicos se excretan por la leche materna.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Lesiones tuberculosas, micóticas ó virales de la piel. En micosis sistemáticas, estados convulsivos y psicosis grave.

Efectos secundarios: Son de rara incidencia y de intensidad leve a moderada. Se pueden presentar signos de atrofia cutánea, irritación, hipertrichosis, hipopigmentación, dermatitis perioral, dermatitis alérgica por contacto, maceración de la piel, infección secundaria, estrías y miliaria. Al igual que con otros corticosteroides tópicos, no debe utilizarse en el tratamiento de acné, rosácea ó dermatitis perioral.

Interacciones farmacológicas: Efecto disminuido por: rifampicina, rifabutina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, efedrina, aminoglutetimida. Antagoniza efecto de: hipoglucemiantes, antihipertensivos, diuréticos. Aumenta efecto de: acetazolamida, diuréticos de asa, carbenoxolona, anticoagulantes cumarínicos. Prolongación del efecto relajante con: relajantes musculares no despolarizantes. Efecto aumentado por: estrógenos.

Vía de administración: Tópica.

Presentación: Crema tópica en tubo de 30 g.

Condiciones de almacenamiento:

Manténgase en un lugar fresco y seco (debajo de 30°C), protéjase de la luz.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PS PHARMACEUTICAL, S.A.

0 Av. C 2-55 Col. Najarito Zona 6 Villa Nueva Guatemala, PBX: (502) 6628-1158