



KETOCONAZOL 2%

Crema tópica



Información farmacológica

KETOCONAZOL 2% CREMA para tratar la afección de tiñas de pies, manos, ingles, zona perianal y cuerpo. Dermatofitosis causadas por Trichopyton sp, Microsporum sp y Epidermophyton sp.

Fórmula: Cada 100 g contienen:

Ketoconazol.....2 g
Excipientes c.s.p.

Dosis: Aplicar una capa delgada de crema 1 ó 2 veces al día sobre el área afectada ó según prescripción médica.

Precauciones: No hay datos ó éstos son limitados relativos al uso de ketoconazol en mujeres embarazadas. Dado que no se absorbe tras aplicación tópica, no está contraindicado en el embarazo. Como medida de precaución, es preferible evitar su uso durante el embarazo y lactancia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Pacientes con historia de alcoholismo ó enfermedades hepáticas, debido a que las lesiones hepatocelulares subyacentes pueden ser exacerbadas por el uso del ketoconazol. No aplicar en piel infectada ó sobre heridas abiertas.

Efectos secundarios: Cambios en la textura del cabello, ampollas en el cuero cabelludo, piel seca, prurito (picazón), cabello o cuero cabelludo aceitoso ó seco, irritación, prurito ó escozor en el lugar donde se aplicó el medicamento.

Interacciones farmacológicas: Anticoagulantes (warfarina): aumento de los niveles plasmáticos de anticoagulantes (riesgo de hemorragia). Antidepresivos tricíclicos: se ha registrado un aumento de los niveles plasmáticos del antidepresivo con posible potencialización de su acción. Antiepilépticos (fenitoína, fenobarbital), antiulcerosos (cimetidina, omeprazol), dinanosina, rifampicina: se han registrado disminuciones del antifúngico en plasma. Antivirales (indinavir, nelfinavir), astemizol, benzodiazepinas, corticosteroides, ciclosporina, cisaprida, loratadina, propafenona, quinidina, terfenadina, tolbutamida y el zolpidem: aumentan sus concentraciones plasmáticas con posible potenciación de su toxicidad por inhibición de su metabolismo hepático debido al KETOCONAZOL.

Vía de administración: Tópica.

Presentación: Crema tópica en tubo de 30 g.

Condiciones de almacenamiento:

Manténgase en un lugar fresco y seco (debajo de 30°C), protéjase de la luz.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PS PHARMACEUTICAL, S.A.

0 Av. C 2-55 Col. Najarito Zona 6 Villa Nueva Guatemala, PBX: (502) 6628-1158