



ZETAWIN[®] plus

Paracetamol + Tramadol

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Paracetamol 325 mg

Tramadol HCl 37.5 mg

Excipientes c.s.p.

INDICACIONES:

Esta indicado para el tratamiento sintomático del dolor moderado a intenso, agudo y crónico.

DOSIS:

Adultos y niños mayores de 16 años: la dosis recomendada es de 1 a 2 tabletas cada 4-6 horas según la respuesta del paciente ante el alivio del dolor, hasta un máximo de 8 tabletas al día.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a sus componentes. En casos de intoxicación aguda con alcohol, fármacos hipnóticos, analgésicos de acción central, opioides o psicotrópicos. Pacientes que están tomando inhibidores de la monoaminoxidasa o que los han recibido en el transcurso de las dos últimas semanas, insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal, epilepsia no controlada con tratamiento, embarazo y lactancia, niños menores de 16 años, ancianos, depresión respiratoria, dependencia al uso de drogas, infecciones del SNC, desórdenes del metabolismo.

ADVERTENCIAS:

Insuficiencia respiratoria grave, la utilización concomitante con los agonistas-antagonistas opioides.

PRECAUCIONES:

Pacientes epilépticos tratados, pacientes con presión intracraneal incrementada o trauma craneoencefálico, uso concomitante con depresivos del SNC, trastornos del tracto biliar, en casos de mareos, somnolencia, debilidad. Evitar bebidas alcohólicas.





REACCIONES ADVERSAS:

Con mayor frecuencia puede presentarse náusea, mareo y somnolencia; frecuentemente dolor de cabeza, temblores, confusión, alteraciones del estado de ánimo, trastornos del sueño, vómitos, estreñimiento, sequedad de la boca al usar hielo, dulces, goma de mascar, se debe chequear con el médico si la boca continúa reseca por más de dos semanas; diarrea, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, sudoración, prurito, reacciones alérgicas anafilácticas, dolor de pecho.

INTERACCIONES:

Inhibidores de la MAO e inhibidores de la recaptación de serotonina, alcohol, carbamacepina, quinidina, anticoagulantes (warfarina), inhibidores del CYP2D6 (fluoxetina, paroxetina y amitriptilina), cimetidina, agonistas-antagonistas opioides (buprenorfina, nalbufina, pentazocina, psicotrópicos benzodiacepinas, barbitúricos, neurolépticos, anestésicos).

SOBREDOSIFICACIÓN: Si acaso, se pueden observar los signos y síntomas de toxicidad de tramadol, de paracetamol o de ambos.

Debido al tramadol los síntomas son: miosis, vómitos, colapso cardiovascular, alteración de la consciencia incluyendo coma, convulsiones y depresión e incluso paro respiratorio.

Debido al paracetamol los síntomas son: palidez, náusea, vómitos, anorexia, dolor abdominal, daño hepático, arritmias cardíacas y pancreatitis.

PRESENTACIÓN: Caja con 20 tabletas en blíster.

Winzzer Medical Corporation
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt

