

Venum®

Composición: Cada tableta recubierta contiene:

Diosmina	450 mg
Hesperidina.....	50 mg
Punicalagina.....	70 mg
Ácido ascórbico.....	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

Indicaciones: *Venum*® tabletas esta indicado para alivio de los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa leve y crónica de las extremidades inferiores (várices) tales como hinchazón, pesadez, dolor, hormiguelo, cansancio; arañas vasculares, sensación de calor, enrojecimiento, sequedad, picor y calambres nocturnos. Alivio de los trastornos hemorroidales que se acompañan por inflamación, fisuras, irritación y enrojecimiento de la región rectal.

Mecanismo de Acción: Punicalagina, Diosmina y Hesperidina ejercen su acción terapéutica a nivel del sistema vascular como venotónicos, vasoprotectores, antiinflamatorios, antioxidantes, además la Punicalagina, como protector arterial, ha demostrado disminuir significativamente la acumulación de triglicéridos y colesterol en las arterias.

La Vitamina C es un importante antioxidante y a su vez permite la formación de colágeno en el endotelio de la pared vascular previniendo la fragilidad capilar y promoviendo la elasticidad del vaso sanguíneo.

Precauciones: Si está embarazada o en periodo de lactancia, o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Advertencias: Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar *Venum*®Tabletas recubiertas.

No utilizar de forma prolongada sin control médico.

Tiempo máximo de uso: A criterio de su médico de confianza.

Interacciones: No se han realizado estudios específicos sobre las posibles interacciones farmacocinéticas y/o farmacodinámicas con otros medicamentos o alimentos hasta la fecha.

Efectos adversos: En el 10% de los pacientes podría provocar efectos adversos poco frecuentes, molestias gástricas tales como: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, insomnio, somnolencia, cansancio, ansiedad, hipotensión.

Dosis y vía de administración: 2 tabletas al día repartidas en dos tomas, uno por la mañana y otro por la noche, con las comidas.

Recomendaciones en caso de sobredosificación: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica local.

Fabricado en Guatemala, C.A., por
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.
0 Av. "C" 2-55, Colonia Najarito, zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C.A.

PBX: (502) 6628-1100 FAX: (502) 6628-1157/65

servicioalcliente@pharmalat.com.gt • www.pharmalat.net



Pharmalat



INNOBIOPHARMA
Innovación en Biología Molecular y Farmacia

Venum[®]

Composition: Each film coated tablet contains:

Diosmin	450 mg
Hesperidin.....	50 mg
Punicalagin.....	70 mg
Ascorbic acid	100 mg
Excipients c.s.p.	1 tablet

Indications: *Venum*[®] tablets is prescribed for the relief of symptoms related to mild and chronic venous insufficiency (varicose veins) in lower extremities, such as swelling, heaviness, pain, tingling sensation, tiredness; spider veins, burning sensation, redness, dryness, itching and night cramps. Relieves hemorrhoidal disorders that cause swelling, fissures, rectal region irritation and redness.

Mechanism of action: *Hesperidina:*

Punicalagin, Diosmin and Hesperidin execute their therapeutical action on the vascular system as venotonics, vasoprotectors, anti-inflammatories and antioxidants. Additional to this, Punicalagin, as an arterial protector, has been proved to substantially decrease the accumulation of triglycerides and cholesterol on the arteries.

Vitamin C is an important antioxidant and at the same time allows collagen formation in the vascular walls endothelium preventing capillary fragility and promoting blood vessel elasticity.

Precautions: If you are pregnant, breast-feeding, think you might be pregnant or plan on getting pregnant, consult your physician or pharmacist before using this medicine.

Warnings: Consult your physician or pharmacist before you start taking *Venum*[®] film-coated tablets.

Do not use them for long periods without medical supervision.

Maximum time of use: Based on your personal doctor's discretion.

Interactions: There have been no specific studies on the possible pharmacokinetic and/or pharmacodynamic interactions with other medications or foods so far.

Adverse effects: In 10% of the patients it could cause unusual adverse effects, gastric discomfort, such as: abdominal pain, nausea, vomits, diarrhea, epigastric pain, insomnia, drowsiness, tiredness, anxiety and hypotension.

Dosage and route of administration: 2 tablets a day divided in two intakes, one in the morning and one at night, with meals.

Recommendations in case of overdose: In case of overdose or accidental ingestion, consult your physician or pharmacist immediately, go to a medical center or call the local Service of Toxicological Information.

Manufactured in Guatemala, C.A., by
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.
0 Av. "C" 2-55, Colonia Najarito, zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C.A.

PBX: (502) 6628-1100 FAX: (502) 6628-1157/65

servicioalcliente@pharmalat.com.gt • www.pharmalat.net



Pharmalat



INNOBIOPHARMA
Innovación en la Medicina