



Pharmalat

Mialprex®

COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA Y JAQUECAS

Su médico le ha recetado **MIALPREX®**, producto cuya fórmula contiene:

Epigallocatequina gallato (Extracto en polvo Thea sinensis).....	10 mg
Zeaxantina (Extracto en polvo de Tagetes erecta).....	10 mg
Betalaina (Extracto en polvo de Beta vulgaris).....	30 mg
Luteolina (Extracto en polvo de Arachis hipogea).....	40 mg
Muricatenol (Extracto en polvo de Anona muricata).....	30 mg
Excipientes c.s.p.....	1 tableta

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE MIALPREX®?

Mialprex® es un conjugado de flavonoides que actúan con sinergismo como potente antioxidante por actuar por diferentes vías biológicas para llevar una adecuada irrigación sanguínea al cerebro, coadyuvando a evitar la migraña, reduciendo la inflamación vascular permitiendo que la sangre nutra al cerebro de oxígeno por modulación del flujo sanguíneo.

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE MIALPREX®?

- Hiperacidez, irritación gástrica, reducción del apetito, diarrea o constipación.
- Contraindicada en pacientes alérgicos al apio y perejil.
- Insuficiencia renal y mujeres embarazadas
- Hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o a alguno de sus componentes.
- No utilizar en menores de 18 años

¿CUÁLES SON LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE MIALPREX®?

- No exceder las dosis recomendadas.
- Utilizar con precaución en pacientes con los siguientes padecimientos: hipertensión, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS DE MIALPREX®?

- En muy raras ocasiones, espasmos abdominales y vómitos.
- En sobredosis puede generar contractibilidad muscular en músculos suaves como vejiga, intestinos y útero.

INTERACCIONES:

Puede intervenir en la reabsorción de medicamentos alcalinos por la unión química con Taninos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Adultos: La dosis que necesite puede variar, dependiendo del tipo, intensidad y duración del dolor. Su médico le indicará cuántas tabletas debe tomar al día y durante cuánto tiempo.

La dosis recomendada es en general de 1 o 2 tabletas al día, según criterio médico.

Vía de administración: Oral.

PRESENTACIÓN:

Caja con 20, 30 y 60 tabletas recubiertas.

OBSERVACIONES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Fabricado en Guatemala, C.A., por/Manufactured in Guatemala, C.A., by
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.

0 Av. "C" 2-55, Colonia Najarito, zona 6 Villa Nueva, Guatemala, C.A.

PBX: (502) 6628-1100 FAX: (502) 6628-1157/65

servicioalcliente@pharmalat.com.gt • www.pharmalat.net



Pharmalat