



Pharmalat

APTIVAL®

Antiasténico

APTIVAL® en su fórmula contiene por cada tableta recubierta:

Aspartato de Arginina.....	500 mg
Tiamina HCl	100 mg
Excipientes c.s.p.	

¿QUÉ ES EL ASPARTATO DE ARGININA? Es un aminoácido glucogénico esencial en el ser humano el cual tiene gran importancia en la biosíntesis de la urea, sistema por el cual se elimina el amoníaco (metabolito tóxico) del organismo, así como en la biosíntesis de la creatina, compuesto esencial en el metabolismo energético.

Se ha relacionado su utilización con el aumento de la producción de la hormona del crecimiento y la estimulación de la función del timo, mejorando la respuesta inmunológica. Este aminoácido esencial está involucrado en la biosíntesis de poliaminas (especialmente putrescina, espermina y espermidina), las cuales estimulan y estabilizan el ADN, estimulan la biosíntesis del ARN y mejora la cantidad y calidad del esperma masculino.

¿PARA QUÉ ESTA INDICADO APTIVAL®? Coadyudante en estados de cansancio físico y mental.

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN DE APTIVAL®? Prevención de estados carenciales de los componentes de la fórmula, debido al incremento de las necesidades, reducción del consumo o reducción de la absorción, que podrían manifestarse en estados de convalecencia o dietas insuficientes, tomar 2 tabletas 30 minutos antes de cada comida por 4 semanas. Embarazo, lactancia y niños menores de 12 años según prescripción médica.

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE APTIVAL®? Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

¿CUÁLES SON LAS PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE APTIVAL®? Afecciones renales, herpes, asma y tumores. Deje de tomar L-arginina por lo menos dos semanas antes de someterse a una cirugía.

Antes de tomar este producto consulte a su médico si está bajo tratamiento, consume productos de venta libre, incluyendo productos naturales y suplementos. Puede no ser capaz de consumir este producto o deba ajustar la dosis del medicamento.

¿CUÁLES SON LAS INTERACCIONES DE APTIVAL®? Se podrían producir las siguientes interacciones: Diuréticos ahorradores de potasio, como amilorida, espironolactona o triamtereno: la administración de arginina podría producir hipercalcemia, especialmente en pacientes con enfermedad hepática grave en tratamiento con diuréticos ahorradores de potasio.

¿CÚAL ES LA PRESENTACIÓN DE APTIVAL®? Caja con 30 tabletas recubiertas en blíster.

**SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y
OBTENDRÁ A CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.**

Droguería y Laboratorio Pharmalat, S. A.
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat

