

Venum[®]

Composición: Cada tableta recubierta contiene:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Diosmina | 450 mg |
| Hesperidina..... | 50 mg |
| Excipientes c.s.p. | 1 tableta |

Indicaciones: *Venum*[®] tabletas esta indicado para alivio de los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa leve y crónica de las extremidades inferiores (várices) tales como hinchazón, pesadez, dolor, hormigueo, cansancio; arañas vasculares, sensación de calor, enrojecimiento, sequedad, picor y calambres nocturnos. Alivio de los trastornos hemorroidales que se acompañan por inflamación, fisuras, irritación y enrojecimiento de la región rectal.

Mecanismo de Acción: Punicalagina, Diosmina y Hesperidina ejercen su acción terapéutica a nivel del sistema vascular como venotónicos, vasoprotectores, antiinflamatorios, antioxidantes, además la Punicalagina, como protector arterial, ha demostrado disminuir significativamente la acumulación de triglicéridos y colesterol en las arterias.

La Vitamina C es un importante antioxidante y a su vez permite la formación de colágeno en el endotelio de la pared vascular previniendo la fragilidad capilar y promoviendo la elasticidad del vaso sanguíneo.

Precauciones: Si está embarazada o en periodo de lactancia, o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Advertencias: Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar *Venum*[®]Tabletas recubiertas.

No utilizar de forma prolongada sin control médico.

Tiempo máximo de uso: A criterio de su médico de confianza.

Interacciones: No se han realizado estudios específicos sobre las posibles interacciones farmacocinéticas y/o farmacodinámicas con otros medicamentos o alimentos hasta la fecha.

Efectos adversos: En el 10% de los pacientes podría provocar efectos adversos poco frecuentes, molestias gástricas tales como: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, insomnio, somnolencia, cansancio, ansiedad, hipotensión.

Dosis y vía de administración: 2 tabletas al día repartidas en dos tomas, uno por la mañana y otro por la noche, con las comidas.

Recomendaciones en caso de sobredosificación: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica local.

Fabricado en Guatemala, C.A., por
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.
PBX: (502) 6628-1100 • www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt



INNOBIOPHARMA
Innovación Biológica Molecular Pharma