

LIMTOX

ADYUVANTE EN LA TERAPIA DE DESINTOXICACIÓN CELULAR

Muchas de las enfermedades crónicas son ocasionadas por las toxinas que acumulamos en el cuerpo por exposición a un medio ambiente contaminado: Humo industrial, polución (smog), derivado del humo vehicular, dietas ricas en grasas saturadas, estilos de vida inapropiados, fumar o consumir alcohol en exceso, estímulos alterados, eliminaciones inadecuadas, etc. Es aconsejable tomar un desintoxicante como **LIMTOX** que además de eliminar toxinas que pueden provocar cáncer también previene otras enfermedades por su amplio campo de acción.

FÓRMULA

Cada sobre de 3 g contiene:

Ácido ascórbico.....	300 mg
(equivalente a ácido ascórbico microencapsulado 309.3mg)	
Glicoproteína.....	100 mg
Proteoglicano.....	50 mg
Conjugado de flavonoides (Fisetina, ácido elágico, betalaína, muricatenol)	400 mg
Excipientes c.s.p.....	3 g

Indicaciones: Adyuvante en la terapia de desintoxicación celular.

Contraindicaciones: Insuficiencia renal crónica, embarazo y lactancia.

Precauciones y advertencias: Debido a la presencia de vitamina C se debe tener precaución en pacientes con insuficiencia renal, ya que puede producir niveles plasmáticos elevados y consecuente formación y precipitación de oxalato. El ácido ascórbico no debe administrarse en dosis altas ya que puede producir un aumento de su metabolismo.

Deberán tener precaución los pacientes en tratamiento con anticoagulantes y pacientes contrastornos en las reservas de hierro.

Consulta al médico en el caso de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Duración del tratamiento: **LIMTOX** debe tomarse de 1 a 3 meses en el año. Para óptimos resultados y una salud permanente puede tomarse por tiempo indefinido sin ningún problema o contraindicación; por ejemplo 1 año y luego suspender por 3 meses si desea volver a tomarse.

Recomendaciones: En pacientes que han sobrevivido al cáncer y en pacientes con antecedentes familiares de cáncer, se recomienda repetir el tratamiento cada año.

Dosis y Modo de Preparar: Adultos: 1 sobre cada 12 horas. Menores de 7 años y pacientes con insuficiencia renal: ½ sobre cada 12 horas. Disolver la dosis que corresponda en un vaso con agua, media o una hora antes o después de cualquier comida.

Vaso con agua pura

1



2

Verter el contenido del sobre



Mezclar y tomar

3



Si quedan residuos, agregar más agua luego tomar

4

* La betalaína proviene de dos fuentes: La remolacha y La tuna opuntia, por esta razón puede variar el color de corinto a marrón; No variando la eficacia y efectividad de este producto.



INNOBIOPHARMA
Innovación Biológica Molecular Pharma



Pharmalat

Fabricado en Guatemala, C.A., por
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.
0 Avenida "C" 2-55, Zona 6 • Colonia Najarito
Villa Nueva, Guatemala • Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • Fax: (502) 6628-1165

Desarrollado por:

Innovación Biológica Molecular Pharma (INNOBIOPHARMA)

www.pharmalat.net