



Alcagel[®]

Antiácido - Antiflatulento

Su médico le ha recetado **Alcagel[®]** suspensión con la finalidad de neutralizarle un exceso de acidez gástrica que tiende a provocar gastritis, esofagitis, hernia hiatal y pirosis. Además **Alcagel[®]** elimina la flatulencia (sensación de llenura) que se presenta en las enfermedades pépticas.

Alcagel[®] en su fórmula contiene:

Cada cucharadita (5 mL):

Hidróxido de aluminio 200 mg

Hidróxido de magnesio..... 200 mg

Dimetilpolisiloxano (Simeticona)..... 20 mg

Vehículo c.s.p.

¿Qué se entiende por gastritis?

Es la inflamación que sufre el tapizado gástrico que puede adoptar dos formas: aguda y crónica. La gastritis aguda se debe a la ingestión de alcohol, medicamentos irritantes o a la presencia de toxinas víricas, bacterianas o químicas. La gastritis crónica constituye en general un signo de alguna enfermedad subyacente, como la úlcera péptica, enfermedad maligna, el síndrome de Zollinger-Ellison o la anemia perniciosa. Existen otros tipos de gastritis denominados por el lugar de origen o por los efectos causales.

¿Cuáles son las indicaciones para Alcagel[®]?

Indicado como antiácido y antiflatulento para el tratamiento de la úlcera péptica, hiperacidez asociada con esofagitis, gastritis, hernia hiatal y pirosis.

¿Qué dosis se aconseja administrar con Alcagel[®]?

La dosis media es de 1-2 cucharaditas 1 ó 2 horas después de las comidas y antes de acostarse. El esquema posológico debe ser individualizado o según criterio médico y estado del paciente.

¿Cuándo debe administrarse Alcagel[®]?

La absorción de algunos medicamentos como tranquilizantes, antibióticos (tetraciclinas), antituberculosos y otros puede disminuir, por lo que se aconseja administrarlos dos horas después de la dosificación de **Alcagel[®]**.

¿Cuándo está contraindicado utilizar Alcagel®?

Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, cálculos de las vías urinarias, hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Embarazo y lactancia . Niños menores de 2 años.

¿Cuáles son las precauciones antes de tomar Alcagel®?

No administrar junto con tetraciclina y sales de hierro.

Insuficiencia hepática (tratamientos prolongados), pacientes geriátricos o debilitados.

¿Cuáles son las advertencias con Alcagel®?

No utilizar más de la dosis recomendada. No utilizar por más de dos semanas sin indicación médica.

¿Cuál es la presentación de Alcagel®?

Caja con frasco con 360 mL.

**SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO
CONSULTÁNDOLE PERIÓDICAMENTE Y OBTENDRÁ A CAMBIO
EXCELENTES RESULTADOS.**

Fabricado en Guatemala, C.A., por
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt

