

APTIVAL® ASPARTATO DE ARGININA

Su médico le ha recetado APTIVAL® solución oral, el cual le va a ayudar en los casos de embarazo, traumatismo, recuperación postoperatoria, desnutrición crónica del adulto, retardo del desarrollo y personas con dieta vegetariana estricta.

Cada ampolla bebible de 10 mL contiene:
Aspartato de arginina..... 5 g
Vehículo c.s.p.

¿QUÉ ES EL ASPARTATO DE ARGININA?

Es un aminoácido glucogénico esencial el cual elimina el amoníaco (metabolito tóxico) del organismo, así como en la biosíntesis de la creatina, compuesto esencial en el metabolismo energético.

Se ha relacionado su utilización con el aumento de la producción de la hormona del crecimiento y la estimulación de la función del timo, mejorando la respuesta inmunológica. Este aminoácido esencial está involucrado en la biosíntesis de poliaminas (especialmente putrecinas, espermina), las cuales estimulan y estabilizan el ADN, estimulan la biosíntesis del ARN y mejora la calidad y la cantidad del espermatozoides masculino.

INDICACIONES

APTIVAL® ampolla bebible se utiliza para la prevención de estados carenciales de aminoácidos por ingesta insuficiente de proteínas, debido a dietas desequilibradas o restrictivas (de adelgazamiento, vegetarianas); convalecencias.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Se desaconseja la utilización mantenida y continuada de este preparado durante largos periodos de tiempo. No se debe exceder la dosis diaria recomendada.

Se requiere precaución en caso de insuficiencia hepática y/o renal graves, y de diabetes.

El principio activo (arginina) podría producir hipercalcemia en pacientes con enfermedad hepática grave o con enfermedad renal.

Las personas con problemas de retención urinaria, sólo lo tomarán bajo control médico.

Los pacientes con fibrosis quística pueden padecer calambres abdominales, pérdida de peso e hinchazón abdominal al tomar este medicamento.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave. Embarazo y lactancia. Niños menores de 12 años.

REACCIONES ADVERSAS

Podrían producirse los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se conoce exactamente:

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Se ha informado de algún caso de trombocitopenia y de hematuria.

Trastornos del sistema inmunológico: En casos raros pueden aparecer reacciones alérgicas (hipersensibilidad) a alguno de los componentes de la formulación.

INTERACCIONES

Diuréticos ahorradores de potasio, como amilorida, espironolactona o triamtereno: la administración de arginina podría producir hipercalcemia, especialmente en pacientes con enfermedad hepática grave en tratamiento con diuréticos ahorradores de potasio.

DOSIS

Niños mayores de 12 años y adultos: se recomienda de 1 ampolla diaria, tomadas en forma pura o diluida con agua o con jugo de frutas, antes de cada comida.

El tratamiento en general no debe sobrepasar dos semanas.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

La ingestión continuada o accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos). Consultar al médico.

PRESENTACIÓN DE APTIVAL® SOLUCIÓN ORAL

Caja con 10 ampollas bebibles.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

APTIVAL®

Solución oral

Pharmalat

0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito, Zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

www.pharmalat.net

servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat