



LEMOVIT® PLUS

ANTIGRI PAL

Su médico le ha recetado **LEMOVIT® PLUS** que en sus dos presentaciones está formulado de la siguiente manera:

Cada tableta recubierta contiene:

Acetaminofén..... 500 mg
Clorfeniramina maleato..... 4 mg
Dextrometorfano HBr..... 25 mg
Fenilefrina HCl..... 10 mg
Ácido Ascórbico..... 50 mg
Excipientes c.s.p.

Cada 5 mL de jarabe contienen:

Acetaminofén..... 125 mg
Clorfeniramina maleato..... 1 mg
Dextrometorfano HBr..... 7.5 mg
Fenilefrina HCl..... 5 mg
Ácido Ascórbico..... 12.5 mg
Vehículo c.s.p.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE LEMOVIT® PLUS? Constituye una mezcla de varios agentes farmacológicos que han demostrado ser capaces de provocar un efecto benéfico en el tratamiento del catarro común, el resfriado y la gripe. El acetaminofén controla la fiebre, el dolor de cabeza y el malestar general. La clorfeniramina tiene acción antihistamínica por lo que se reduce la secreción excesiva. La fenilefrina posee efecto descongestivo por lo que facilita la respiración. El dextrometorfano actúa directamente en el centro de las toses irritativas y no productivas que son las consumidoras de fuerzas. La vitamina C refuerza las defensas naturales del organismo para prevenir complicaciones e infecciones oportunistas.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

LEMOVIT® PLUS TABLETA RECUBIERTA: Adultos y niños mayores de 12 años: Tomar 1 tableta cada 4 ó 6 horas.

LEMOVIT® PLUS JARABE: Niños de 6 a 12 años: Tomar 2 cucharaditas (10 mL) cada 6 horas. Niños mayores de 12 años y adultos: Tomar 1 cucharada (15 mL) cada 6 horas.

¿CÚAL ES LA PRESENTACIÓN DE LEMOVIT® PLUS?

LEMOVIT® PLUS TABLETA RECUBIERTA: Caja con 10 tabletas y dispensador con 25 carteritas conteniendo 4 tabletas cada una.

LEMOVIT® PLUS JARABE: Caja con 1 frasco con 120 mL.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad hacia alguno de los componentes.

PRECAUCIONES: Embarazo y lactancia sólo por prescripción médica.

ADVERTENCIAS: No administrar más de 5 veces al día la dosis recomendada, ni por más de 5 días consecutivos en niños, o por más de 10 días consecutivos en adultos. Si persiste el dolor o la fiebre por más de 3 días, consultar al médico. Puede causar somnolencia. No administrar a personas alérgicas a la tartrazina.

ES ACONSEJABLE TOMAR SUFICIENTE LÍQUIDO Y EN CASO DE QUE LOS SÍNTOMAS PERSISTAN POR MÁS DE 3 DÍAS DEBE ACUDIR NUEVAMENTE A SU MÉDICO. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y A CAMBIO OBTENDRÁ MEJORES RESULTADOS.

Fabricado en Guatemala, C. A. por
Pharmalat, S.A.

0 Ave. "C" 2-55, Col. Najarito, Zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

www.pharmalat.net

servicioalcliente@pharmalat.com.gt

