



# Micoderm<sup>®</sup>

Miconazol 2%  
Antimicótico dermatológico

Su médico le ha recetado **MICODERM<sup>®</sup>** por sus efectos como antimicótico, fungicida y bactericida a nivel dermatológico de manera rápida y segura.

## ¿CUÁL ES LA FÓRMULA DE MICODERM<sup>®</sup>?

**Cada 30 gramos de crema tópica contienen:**

Nitrato de Miconazol.....600 mg  
Vehículo c.s.p.

**Cada 1 mL de solución tópica contiene:**

Nitrato de Miconazol.....20 mg  
Vehículo c.s.p.

**¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE MICODERM<sup>®</sup>?** Micosis cutáneas provocadas por dermatofitos, mohos, levaduras y otro tipo de hongos, en las manos, pies u otras zonas cutáneas.

**¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE MICODERM<sup>®</sup>?** Hipersensibilidad al ingrediente activo o componentes de la fórmula. Primer trimestre del embarazo. No debe aplicarse en mucosas.

## ¿CUÁL ES EL MODO DE EMPLEO DE MICODERM<sup>®</sup>?

**Micosis Cutáneas:** Aplíquese un poco de crema ó solución en el área infectada dos veces al día. Frote suavemente la crema ó solución con el dedo hasta que haya penetrado por completo en la piel. Una vez desaparecida la lesión (lo que ocurre, de ordinario, al cabo de 2 a 5 semanas) prosigase el tratamiento durante 10 días, con el fin de prevenir la re-infección.

**Micosis de las uñas:** Córtese la uña infectada tanto como sea posible. Aplíquese un poco de crema ó solución una vez al día en la uña y cúbrase con una venda de plástico oclusiva no perforada. Tras la caída de la uña se seguirá con el tratamiento ininterrumpidamente hasta que crezca la nueva uña y se observe la curación definitiva (en la mayoría de los casos, transcurridos 7 meses ó más).

**¿QUÉ ADVERTENCIA TIENE MICODERM<sup>®</sup>?** En caso de reacción de hipersensibilidad, suspender el tratamiento y consultar nuevamente al médico.

## ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE MICODERM<sup>®</sup>?

Micoderm al 2% crema tópica: caja con 1 tubo conteniendo 5, 10, 15, 25, 30, 60, 100 y 120 gramos.

Micoderm al 2% solución tópica: caja con 1 frasco gotero con 15 y 30 mL.

**SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.**

Fabricado en Guatemala, C.A., por  
**Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.**  
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito  
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C.A.  
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157  
[www.pharmalat.net](http://www.pharmalat.net)  
[servicioalcliente@pharmalat.com.gt](mailto:servicioalcliente@pharmalat.com.gt)



**Pharmalat**

