



VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

FÓRMULA: Cada tableta recubierta contiene:

Sildenafil Citrato..... 100 mg

Excipientes c.s.p.

INDICACIONES: **NOVAR-ON®** está indicado en el manejo de la disfunción eréctil. La causa de esta condición puede ser psicológica, orgánica o la combinación de ambas. El Sildenafil, principio activo de **NOVAR-ON®**, es hoy en día quizás el medicamento de primera elección en el manejo de la disfunción eréctil, siendo generalmente más efectivo en los casos de origen orgánico de leve a moderado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: La evaluación cardiovascular del paciente es necesaria antes de iniciar cualquier tratamiento para la disfunción eréctil. No administrar conjuntamente con ritonavir, saquinavir o medicamentos que contengan nitratos como mononitrato de isosorbide o trinitrato de glicerilo.

CONTRAINDICACIONES: **NO APTO PARA MUJERES Y HOMBRES QUE NO PADEZCAN DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL, EN PACIENTES DIABÉTICOS O HIPERTENSOS CON CARDIOPATÍA; SU USO DEBE SER BAJO ESTRICTA VIGILANCIA MÉDICA.**

DOSIS: La dosis usual es de 50 mg (1/2 tableta) una hora antes de la actividad sexual. La dosis puede ser mayor o menor dependiendo del efecto del medicamento. La dosis máxima recomendada es de 100 mg al día.

**GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO (Debajo de 30°C)
PROTÉJASE DE LA LUZ. PRODUCTO MEDICINAL, MANTÉNGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.**