



Vitaliver[®] Forte

Hepatoprotector con fosfolípidos esenciales

FÓRMULA:

Cada cápsula de Gelatina Suave contiene:

Lecitina de soya equivalente a 300 mg de fosfolípidos esenciales (Colina, Etanolamina, Inositol y Serina).....	600 mg
Vitamina B1.....	10 mg
Vitamina B2.....	10 mg
Vitamina B6.....	3 mg
Vitamina B12.....	5 mcg
Vitamina E.....	15 mg
Nicotinamida.....	50 mg
Ácido Fólico.....	150 mcg
DL-Metionina.....	10 mg
Betaína HCl.....	10 mg
Ácido ursodesoxicólico.....	10 mg
Excipientes c.s.p.	

¿Cuáles son las indicaciones de Vitaliver Forte®?

Está indicado específicamente en enfermedades hepáticas tanto agudas como crónicas (coadyuvante en hepatitis, cirrosis, hígado graso, ictericia obstructiva, etc), es adecuado en todos aquellos casos que requiera proteger o mejorar la función del hígado por la acción de sus 3 funciones: lipotrópica, desintoxicante y protector hepático.

¿Qué contraindicaciones tiene Vitaliver Forte®?

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. No consuma este medicamento si usted padece las siguientes condiciones: arritmia cardíaca, embarazo, enfermedades de la piel, infarto agudo del miocardio, insuficiencia renal o hepática, diabetes mellitus, si es fumador ocasional, enfermedad de Leber, hipertiroidismo, úlcera péptica activa.

¿Qué precauciones se deben tener con Vitaliver Forte®?

Antes de usar Vitaliver Forte® debe informar a su médico: si está tomando cualquier medicamento (por ejemplo: vitaminas, suplementos de hierbas, etc.), alergias, enfermedades pre-existentes y estados actuales por ejemplo:

embarazo, próxima cirugía, lactancia, deficiencia de hierro, dificultad para respirar, deficiencia de ácido fólico. Algunos trastornos de salud pueden hacerlo más susceptible a los efectos secundarios del fármaco.

¿Cuáles son los efectos secundarios de Vitaliver Forte®?

Entre los más comunes se encuentran: náusea, ardor o sensación de tirantez, malestar estomacal, picazón, somnolencia, estremecimiento, dolor de cabeza, neuropatía periférica, hinchazón de labios, inflamación de la cara y la lengua, dificultad para respirar, diarrea, visión borrosa. Estos no siempre se producen pero si ocurren o persisten consulte a su médico.

¿Qué dosis se aconseja de Vitaliver Forte®?

Se debe tomar 1 o 2 cápsulas de gelatina suave 3 veces al día o según criterio médico.

¿Cuál es la presentación de Vitaliver Forte®?

Caja con 20 cápsulas de gelatina suave.

Fabricado en Guatemala, C.A., por
Farmacaps, S.A., para
Pharmalat, S.A., Guatemala
0 Ave. "C" 2-55, Col. Najarito, Zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
contacto@pharmalat.net

