



Abdol®

Analgésico/Antiinflamatorio

Su médico le ha recetado **Abdol®**, producto cuyas fórmulas contienen:

FÓRMULA:

Abdol® Gotas, cada 1 mL contiene:

Diclofenaco sódico (eq. a diclofenaco resinato)..... 15 mg
Vehículo c.s.p.

Abdol® Tabletas, cada tableta contiene:

Diclofenaco sódico 50 mg
Excipientes c.s.p.

Abdol® es un antiinflamatorio no esteroideo con marcadas propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. La inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas, que ha sido demostrada experimentalmente, se considera que tiene una importante relación con su mecanismo de acción. Las prostaglandinas desempeñan un papel esencial en la aparición de la inflamación, del dolor y la fiebre. Efectos Farmacodinámicos: en las afecciones reumáticas, las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del diclofenaco proporcionan una respuesta clínica caracterizada por una marcada mejoría de los signos y síntomas, tales como dolor en reposo, dolor en movimiento, rigidez matinal, tumefacción de las articulaciones, así como por una mejora de la capacidad funcional. En las inflamaciones postraumáticas, el diclofenaco alivia y reduce la tumefacción inflamatoria y el edema traumático.

INDICACIONES: **Abdol®** está indicado en el tratamiento inicial de padecimientos músculo esqueléticos (artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante, ataques de gota, dolor por cálculos renales, alivio del dolor post-quirúrgico, procesos traumáticos, cólicos menstruales (dismenorrea). Procesos inflamatorios de vías respiratorias superiores con o sin componente febril y dolor.

CONTRAINDICACIONES: Este medicamento no debe administrarse en los siguientes casos:
Pacientes con hipersensibilidad al diclofenaco o alguno de los componentes de la fórmula.
Al igual que otros AINEs el diclofenaco está también contraindicado en pacientes en los que la administración de ácido acetilsalicílico u otros AINEs haya desencadenado ataques de asma, urticaria o rinitis aguda.
Pacientes con enfermedad de Crohn activa
Pacientes con colitis ulcerosa activa
Pacientes con insuficiencia hepática grave
Pacientes con insuficiencia renal grave
Pacientes con desórdenes de la coagulación
Pacientes con sospecha de Dengue o Zika por riesgo al sangrado
Antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación (dos o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados) relacionados con tratamientos anteriores con AINEs.
Úlcera/hemorragia/perforación gastrointestinal.
Insuficiencia cardíaca congestiva establecida (clasificación II-IV de NYHA), cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular.
Tercer trimestre de gestación.





Abdol[®]

Analgésico/Antiinflamatorio

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Se debe evitar la administración concomitante de diclofenaco con otros AINEs, incluyendo los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 (Coxib), debido a la falta de evidencia de efectos sinérgicos y a los efectos adversos potenciales aditivos. Se debe tener precaución con los ancianos debido a sus condiciones médicas. En pacientes ancianos o con bajo peso corporal, se recomienda utilizar la dosis menor efectiva. Al igual que con otros AINEs, con el diclofenaco en casos raros, pueden aparecer reacciones alérgicas, inclusive reacciones anafilácticas o anafilactoides, aunque no haya habido exposición previa al medicamento. También se corre riesgo de que se puedan enmascarar los signos y síntomas de una infección debido a sus propiedades farmacodinámicas. Riesgos gastrointestinales, durante el tratamiento con AINEs, entre estos el diclofenaco, se han notificado hemorragias gastrointestinales, úlceras y perforaciones (que pueden ser mortales) en cualquier momento del mismo, con o sin síntomas previos de alerta y con o sin antecedentes de acontecimientos gastrointestinales graves previos. El riesgo es mayor en los ancianos. Si se produjera una hemorragia gastrointestinal o una úlcera en pacientes en tratamiento con diclofenaco, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente. Riesgos cardiovasculares o cerebrovasculares, se debe tener una precaución especial en pacientes con antecedentes de hipertensión y/o insuficiencia cardíaca (clasificación I de NYHA) ya que se ha notificado retención de líquidos y edema en asociación con el tratamiento con AINEs.

NO ADMINISTRAR A PERSONAS ALÉRGICAS A LA TARTRAZINA.

INTERACCIONES: Litio, digoxina, antagonista de calcio, fármacos antihipertensivos, otros AINEs y corticosteroides, anticoagulantes, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), antidiabéticos, antibacterianos (Quinolonas y Ceftriaxona), fenitoína y alcohol.

REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones adversas pueden reducirse si se utiliza la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible para controlar los síntomas. Las reacciones adversas que se observan con más frecuencia son de naturaleza gastrointestinal. Pueden producirse úlceras pépticas, perforación o hemorragia gastrointestinal, en algunos casos mortales, especialmente en los ancianos. También se ha notificado náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, constipación, dispepsia, dolor abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, exacerbación de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Se ha observado menos frecuentemente la aparición de gastritis.

SOBREDOSIS: En caso de sobredosificación se pueden observar síntomas como: vómitos, hemorragia gastrointestinal, diarrea, mareos, tinnitus o convulsiones. Las medidas terapéuticas consisten en medidas de apoyo y tratamiento sintomático.

DOSIS:

Abdol[®] tabletas (50 mg): 1 tableta cada 8 ó 12 horas de preferencia durante o después de las comidas.

Abdol[®] gotas (15 mg/1 mL): Niños mayores de 1 año de 1 a 4 gotas por kilo de peso corporal, dividido en 2 ó 3 tomas al día.

PRESENTACIONES:

Abdol[®] tabletas (50 mg): Caja con 10 y 100 tabletas en blíster.

Abdol[®] gotas (15 mg/1 mL): Frasco gotero con 15 mL.

**SIGA EXACTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO CONSULTÁNDOLE
PERIÓDICAMENTE Y A CAMBIO OBTENDRÁ RESULTADOS SATISFACTORIOS.**

Fabricado por **Pharmalat, S. A.**
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt

