



Pharmalat

BESIC DERM[®]

ANTIMICOTICO ORAL

Su médico le ha recetado **BESIC DERM[®]**, que en su fórmula contiene:

BESIC DERM[®] 150 mg cada cápsula contiene:

Fluconazol..... 150 mg

Excipientes c.s.p.

BESIC DERM[®] 200 mg cada cápsula contiene:

Fluconazol..... 200 mg

Excipientes c.s.p.

¿QUÉ INDICACIONES TIENE BESIC DERM[®] Y CUAL ES LA DOSIS RECOMENDADA?

En infecciones dérmicas, Tinea pedis, corporis, cruris: 1 cápsula diaria por 4 días ó 1 cápsula semanal por 4 semanas. **Tinea unguium:** 1 cápsula semanal por 8 a 12 semanas, de preferencia si se acompaña la terapia sistémica con terapia local, (por ejemplo con Micoderm 2% solución tópica).

Candidiasis vaginal: 1 cápsula como dosis única, repitiendo la dosis en una semana.

Candidiasis orofaríngea: 1 cápsula diaria por 7 o 14 días, dependiendo de la severidad de la infección. En pacientes con Sida después de haber recibido el tratamiento primario completo puede administrarse una dosis semanal de 150 mg de Fluconazol.

Meningitis micótica: 1 a 2 cápsulas diarias durante 8 semanas.

MECANISMO DE ACCIÓN DE BESIC DERM[®] Es un antimicótico triazólico que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol en hongos y levaduras, el cual presenta una absorción casi completa después de su administración oral sin que la acidez gástrica o la presencia de alimentos modifiquen su biodisponibilidad, con una vida media de 25 a 30 horas y excreción renal en un 90 %. Alcanza concentraciones similares al ser administrado por vía intravenosa, a nivel del sistema nervioso central, siendo las concentraciones que se alcanzan en plasma del orden del 50 al 90 %; se liga entre un 11 y 12 % a las proteínas y es altamente hidrosoluble.

¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS TIENE BESIC DERM[®]? Lo más frecuente son los asociados al aparato gastrointestinal tales como náuseas, vómito y flatulencia, en raras ocasiones ictericia y rash cutáneo.

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE BESIC DERM[®]? En menores de 18 años, embarazo, lactancia, hipersensibilidad al medicamento.

¿CUÁLES SON LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE BESIC DERM[®]? Pacientes con insuficiencia hepática o renal, con reacciones cutáneas exfoliativas como síndrome de Stevens Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y Sida.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE BESIC DERM[®]?

BESIC DERM[®] 150 mg, caja con 2, 4, 10, 20, 30 y 50 cápsulas en blister.

BESIC DERM[®] 200 mg, caja con 2, 4, 10, 20, 30 y 50 cápsulas en blister.

Fabricado en Guatemala, C.A., por/
Manufactured in Guatemala, C.A., by
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.

0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat

