



Biosine®

AZITROMICINA

Su médico le ha recetado **BIOSINE®** que en su fórmula:

Cada frasco con polvo para 5 mL de suspensión oral contiene:

Azitromicina 200 mg

Cada tableta contiene:

Azitromicina 500 mg

¿CÓMO ACTÚA BIOSINE®?

Inhibiendo la síntesis de proteínas en las bacterias. Alcanza niveles plasmáticos pico en 3 horas. En todas la infecciones provocadas por estreptococos a nivel orofaríngeo exceptuándose fiebre reumática en donde se aconseja usar penicilina.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES INDICACIONES DE BIOSINE®?

Está indicado en infecciones causadas por organismos susceptibles como: infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo bronquitis y neumonía, infecciones de la piel y tejidos blandos, otitis media, infecciones del tracto respiratorio superior, incluyendo sinusitis y faringitis/amigdalitis. En enfermedades de transmisión sexual en ambos sexos, la azitromicina está indicada en el tratamiento de infecciones genitales no complicadas debidas a Chlamydia trachomatis. También está indicada en el tratamiento de chancro debido a Haemophilus ducreyi y en infecciones genitales no complicadas debidas a Neisseria gonorrhoeae no multirresistente; debe excluirse la infección concurrente por Treponema pallidum.

BIOSINE® está indicado solo o en combinación con rifabutina para la profilaxis frente a la infección por Mycobacterium avium intracelular, una infección oportunista prevalente en pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

¿CUÁL ES LA DOSIS DE BIOSINE®?

La dosis recomendada es la siguiente:

BIOSINE® 200 mg polvo para suspensión oral: Niños: 10 mg por kg de peso en una sola toma por 3 días o según prescripción médica.

BIOSINE® 500 mg tabletas: Adultos: 1 tableta al día por 3 días o según prescripción médica. Administrar 2 horas antes ó 2 horas después de las comidas.

Ajuste la dosis en pacientes con disfunción renal o hepática, consulte a su médico. Ajuste la dosis en disfunción hepática: utilizar con cautela debido al potencial de hepatotoxicidad.

¿CÓMO SE PREPARA BIOSINE® SUSPENSIÓN?

Retire la tapa, agregue agua al tiempo recientemente hervida hasta la flecha indicadora. Tape el frasco nuevamente y agite bien hasta que se suspenda el polvo, vierta en una cucharadita y administre. Una vez preparada la suspensión debe ser desechada a los 5 días sino a sido usada.

¿QUÉ CONTRAINDICACIONES TIENE BIOSINE®?

Su uso está contraindicado en pacientes con una historia de reacciones alérgicas a la azitromicina o a cualquier otro antibiótico macrólido.

¿QUÉ PRECAUCIONES TIENE BIOSINE®?

En pacientes geriátricos y en pacientes con disfunción renal y hepática, embarazo y lactancia según criterio del médico. Este producto contiene dentro de su fórmula Aspartame, no es recomendado para pacientes con fenilcetonuria. No utilizar en niños menores de 6 meses.

¿CON QUÉ PUEDE INTERACTUAR BIOSINE®?

Con antiácidos que contengan hidróxido de aluminio o magnesio, atorvastatina, digoxina, dihidroergotamina, ergotamina, lovastatina.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE BIOSINE®?

Polvo para suspensión oral: Caja con 3 frascos.

Tabletas: Caja con 3 tabletas en blíster.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

AUNQUE BIOSINE ES UN ANTIBIÓTICO SEGURO Y EFICAZ, SUELE SUCEDER QUE ALGUNA BACTERIA SEA NO SUSCEPTIBLE A LA AZITROMICINA. POR LO QUE SI LAS MOLESTIAS CONTINÚAN 6 HORAS DESPUÉS DE LA SEGUNDA DOSIS ES ACONSEJABLE QUE ACUDA NUEVAMENTE A SU MÉDICO. GENERALMENTE LOS RESULTADOS SON SATISFACTORIOS DEBIDO A QUE SU MÉDICO TIENE CONOCIMIENTOS FARMACOLÓGICOS SOBRE ESTE PRODUCTO.

Fabricado en Guatemala, C.A., por/
Manufactured in Guatemala, C.A., by
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat

