



Blodin® Calcio

SUPLEMENTO DE CALCIO

Su médico le ha recetado **Blodin® Calcio** el cual contiene en sus dos presentaciones la siguiente fórmula:

	Cada 15 mL de suspensión:	Cada tableta masticable:
Fosfato tribásico de calcio equivalente a 116.29 mg de calcio y 59.90 mg de fósforo	-----	300 mg
Fosfato tribásico de calcio equivalente a 400 mg de calcio y 206 mg de fósforo	1031.32 mg	-----
Vitamina D3	400 UI	400 UI
Fluoruro de sodio equivalente a 1 mg de flúor	2.21 mg	-----
Lisina HCl	50 mg	-----

El calcio es el quinto elemento por orden de abundancia en el organismo humano y se encuentra especialmente en los huesos (más del 90%); además de su función estructural el cuerpo necesita iones de calcio para la transmisión de los impulsos nerviosos, la contracción muscular, la coagulación sanguínea, la función cardíaca y otros procesos vitales. Es fundamental su administración en casos de raquitismo y enfermedades óseas como la osteoporosis.

La fórmula de **Blodin® Calcio** Suspensión y **Blodin® Calcio** tabletas ha sido desarrollada como coadyuvante en estados carenciales de calcio y vitamina D.

¿EN QUÉ CASOS NO DEBE ADMINISTRARSE BLODIN® CALCIO?

Hipercalcemia, calciuria, insuficiencia renal grave, personas con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, hipoparatiroidismo, cálculos renales, sarcoidosis.

¿QUÉ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DEBE TOMAR ANTES DE USAR BLODIN® CALCIO?

Embarazo y lactancia. En tratamientos prolongados se aconseja evaluar la presencia de calcio en la orina así como el funcionamiento renal. Cardiopatía.

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN RECOMENDABLE DE BLODIN® CALCIO?

Niños de 4 a 10 años: 2 cucharaditas (5 mL) 3 veces al día.

Niños mayores de 10 años y adultos: 1 cucharada (15 mL) ó 1 tableta masticable 3 veces al día o según criterio médico. La duración del tratamiento con BLODIN® CALCIO va desde 1 hasta 3 meses.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE BLODIN® CALCIO?

Se presenta en frasco con 240 mL de suspensión oral y caja de 30 tabletas masticables, las dos presentaciones con un agradable sabor a vainilla.

LA ANTERIOR ES UNA GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE DOSIS PROMEDIO QUE PHARMALAT SUGIERE, SIENDO LA DOSIS MÁS RECOMENDABLE LA QUE SU MÉDICO LE INDIQUE, POR LO TANTO SIGA SUS INSTRUCCIONES.

Fabricado en Guatemala, C. A., por/Manufactured in Guatemala, C.A., by **Pharmalat, S.A.**

0 Ave. "C" 2-55, Col. Najarito, Zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat

