



Blodin® Hierro

Antianémico
vitaminado

Su médico le ha recetado **Blodin® Hierro** el cual contiene en sus dos presentaciones la siguiente fórmula.

Cada cápsula contiene:

Fumarato ferroso (equivalente a 98.6 mg de hierro elemental).....300 mg
Ácido Fólico..... 5 mg
Vitamina B1 (Tiamina HCl)..... 5 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)..... 2.5 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)..... 10 mcg
Excipientes c.s.p.

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Sulfato ferroso heptahidratado (equivalente a 30 mg de hierro elemental)..... 150 mg
Ácido Fólico..... 150 mcg
Vitamina B1 (Tiamina HCl)..... 10 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)..... 15 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)..... 5 mcg
Vehículo c.s.p.

El hierro es un mineral muy importante para el adecuado funcionamiento del metabolismo sanguíneo, su deficiencia constituye la causa más frecuente de anemia nutricional en seres humanos. Su ingestión junto con vitamina C o carnes aumenta su absorción en el tubo digestivo.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE BLODIN® HIERRO? Anemia ferropénica, anemia carencial, desnutrición, enfermedades debilitantes crónicas, recuperación de traumatismos o cirugías, hemorragias menstruales abundantes, hipermétrorragias.

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE BLODIN® HIERRO? En úlcera gástrica o duodenal, gastritis o colitis erosiva, cáncer de estómago o duodeno, trastornos en el metabolismo del hierro y disfunción hepática y renal. Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

¿CUÁLES SON LAS ADVERTENCIAS DE BLODIN® HIERRO?

No ingerir antiácidos de Aluminio y Magnesio durante el tratamiento con este producto. En embarazo y lactancia consultar con el médico.

¿PUEDE PROVOCAR ALGUNAS REACCIONES BLODIN® HIERRO? Ocasionalmente pirosis, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento y diarrea, que resuelven al disminuir la dosis inicial. Por lo mismo se recomienda iniciar con dosis bajas para aumentarlas paulatinamente.

¿QUÉ DOSIS SE ACONSEJA ADMINISTRAR CON BLODIN® HIERRO?

Blodin® Hierro Cápsulas: Adultos 1 ó 2 cápsulas al día, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas o de otros medicamentos.

Blodin® Hierro Jarabe: Niños de 2 a 6 años: 1 cucharadita (5 mL) 3 veces al día. Niños mayores de 6 años y adultos: 1 cucharada (15 mL) 3 veces al día o según prescripción médica.

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES EN CASO DE SOBREDOSIS? Ocurre más frecuente en niños por ingestión accidental. Se recomienda observar cuidadosamente al paciente durante un período de 24 horas, en ocasiones puede presentar una mejoría transitoria de los síntomas para posteriormente presentar recaída súbita y grave. En los primeros minutos post-ingestión se deberá efectuar lavado gástrico con una solución de bicarbonato.

En casos de carencias nutricionales de vitaminas, el déficit se presenta en varios grupos vitamínicos por lo tanto, es aconsejable la administración de un preparado con el cual se puede corregir este déficit multivitamínico. Blodin® Hierro está formulado específicamente para personas con déficit de hierro y se acompaña de vitaminas del complejo B para proporcionar un tratamiento más completo.

¿CÚALES SON LAS INTERACCIONES DE BLODIN® HIERRO? La absorción del hierro se ve disminuida cuando se asocia su uso al de antiácidos, carbonato de calcio, colestiramina, tetraciclinas y uricosúricos. El ácido fólico puede bloquear la acción del metotrexato y sulfas. De igual forma, la absorción del ácido fólico se reduce cuando se asocia a alcohol, anovulatorios orales y anticonvulsivos. Cuando se asocia con pirimetamina y trimetoprima se bloquea la acción de estos fármacos, el alcohol disminuye la concentración de tiamina y piridoxina. La vitamina B12 ve disminuída su absorción cuando está asociada con biguanidas, cuando se asocia con colchicina y neomicina se produce una mala absorción.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE BLODIN® HIERRO? Caja con 30 cápsulas y caja con 1 frasco conteniendo 240 mL de jarabe.

Fabricado en Guatemala, C.A., por/
Manufactured in Guatemala, C.A., by

Pharmalat, S.A.

0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito, Zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

www.pharmalat.net



Pharmalat

