



Depotrex[®]

Gel Tópico

Dexketoprofeno 12.5 mg/g

Fórmula:

Cada gramo de gel contiene:

Dexketoprofeno 12.5 mg

(equivalente a 18.46 mg de Dexketoprofeno Trometamol)

Excipientes c.s.p. 1 g

Contiene además: Salicilato de Metilo, Cúrcuma longa, mentol y alcanfor.

¿Qué es el Dexketoprofeno Trometamol?

Es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo perteneciente a la clase de los derivados de ácido propiónico, ampliamente usados a través de los años, ejerce su acción analgésica y antiinflamatoria por medio de la inhibición de las síntesis de prostaglandinas, esto lo logra al inhibir las enzimas ciclooxigenasa 1 (COX 1) y ciclooxigenasa 2 (COX 2).

¿Para qué se utiliza Depotrex[®] gel tópico?

Su médico le ha recetado este medicamento para el alivio sintomático de afecciones dolorosas leves a moderadas e inflamación de origen traumático o degenerativo de las articulaciones, ligamentos, tendones y músculo.

¿Cómo utilizar Depotrex[®] gel tópico?

Se recomienda utilizar **Depotrex[®] gel tópico** tres veces al día, aplicando una capa en el área afectada y luego realice un suave masaje.

¿Cuáles son las precauciones de Depotrex[®] gel tópico?

Tomar las siguientes precauciones al utilizar **Depotrex[®] gel tópico**:

- Evaluar en el paciente con antecedentes de reacciones de fotosensibilidad.
- Realizar un lavado de manos cuidadoso después de cada aplicación.
- No utilizar ropa ajustada o vendajes oclusivos en la zona de aplicación.
- Interrumpir el tratamiento con **Depotrex[®] gel tópico** en caso de alguna erupción cutánea.
- No aplicar en los ojos, mucosas o en heridas expuestas.
- No ingerir.
- **Depotrex[®] gel tópico** contiene 150 mg de etanol por cada 1.0 g de gel (equivalente a 15%). Puede causar sensación de ardor en piel lesionada.

¿Cuáles son las contraindicaciones de Depotrex[®] gel tópico?

No debe administrarse en los siguientes casos:

- En pacientes con hipersensibilidad al Ketoprofeno o Dexketoprofeno.
- Pacientes en tratamiento con ácido acetilsalicílico.
- En niños menores de 6 años.
- En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

¿Cuáles son las posibles reacciones adversas de Depotrex[®] gel tópico?

- Enrojecimiento en la zona aplicada.
- Erupciones cutáneas.
- No exponer la zona a la luz solar directa ya que es posible una reacción de fotosensibilidad en la zona aplicada, ya que también contiene extracto de cúrcuma.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

Vía de administración: Tópica.

Presentaciones: Caja con tubo con 30 g y 100 g.

Producto medicinal, mantener fuera del alcance de los niños.


Manténgase en un lugar seco y fresco a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz.

FORMA DE APLICACIÓN

Aplica únicamente para presentación de 100 g.


1

Retire hacia arriba la tapa del tubo con aplicador/masajeador.



2

Sujete la parte del aplicador y gire hacia la izquierda hasta que la flecha indicadora esté en la posición "ON", abierta. Presione levemente el tubo hasta que salga la cantidad suficiente de gel para cubrir el área a tratar.



3

Masajear con el aplicador de 5 esferas la superficie del músculo o área a tratar ejerciendo un poco de presión. De ser necesario, presionar de nuevo el tubo para aplicar más Depotrex[®] gel tópico.



Fabricado en Guatemala, C. A., por
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S. A., Guatemala.
PBX: (502) 6628-1100 · sac@pharmalat.net
www.pharmalat.net





Depotrex[®]

Topical Gel

Dexketoprofeno 12.5 mg/g

Active ingredients:

Each gram of gel contains:

Dexketoprofen 12.5 mg

(equivalent to 18.46 mg of Dexketoprofen Trometamol)

Excipients q.s. 1 g

Also contains: Methyl salicylate, Curcuma longa, menthol and camphor.

What is Dexketoprofen Trometamol?

It is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic belonging to the class of propionic acid derivatives, widely used over the years, it exerts its analgesic and anti-inflammatory action by inhibiting the synthesis of prostaglandins, this is achieved by inhibiting cyclooxygenase enzymes 1 (COX 1) and 2 (COX 2).

What is Depotrex[®] topical gel used for?

Your doctor has prescribed this medication for the symptomatic relief of mild to moderate painful conditions and traumatic or degenerative inflammation of the joints, ligaments, tendons, and muscle.

How to use Depotrex[®] topical gel?

It is recommended to use **Depotrex[®] topical gel** three times a day, applying a layer to the affected area and then gently massaging.

What are the precautions of Depotrex[®] topical gel?

Take the following precautions when using **Depotrex[®] topical gel**:

- Evaluate in patients with a history of photosensitivity reactions.
- Wash your hands thoroughly after each application.
- Do not use tight clothing or occlusive bandages in the application area.
- Interrupt treatment with **Depotrex[®] topical gel** in case of a skin rash.
- Do not apply to eyes, mucous membranes or exposed wounds.
- Do not eat.
- **Depotrex[®] topical gel** contains 150 mg of ethanol per 1.0 g of gel (equivalent to 15%). May cause burning sensation on injured skin.

What are the contraindications of Depotrex[®] topical gel?

It should not be administered in the following cases:

- In patients with hypersensitivity to Ketoprofen or Dexketoprofen.
- Patients treated with acetylsalicylic acid.
- In children under 6 years of age.
- In pregnant or breastfeeding women.

What are the possible adverse reactions of Depotrex[®] topical gel?

- Redness in the applied area.
- Rashes.
- Do not expose the area to direct sunlight as a photosensitivity reaction is possible in the applied area, as it also contains turmeric extract.
- If you think that any of the side effects that you experience are serious or if you notice any effects not mentioned in this leaflet, tell your doctor.

Administration route: Topical.

Presentations: Box with ointment tube with 30 g and 100 g.

Medicinal product, keep out of reach of children.


Keep in a dry and cool place at a temperature below 30°C, protected from light.

INSTRUCTIONS FOR USE

Applies only to 100 g presentation.


1

Pull the cap upwards from the applicator/massager tube.



2

Hold the applicator part and turn it counterclockwise until the indicator arrow is in the "ON" position. Gently squeeze the tube until enough gel is dispensed to cover the area to be treated.



3

Massage the 5-sphere applicator onto the surface of the muscle or area to be treated, applying gentle pressure. If necessary, press the tube again to apply more Depotrex[®] topical gel.



Manufactured in Guatemala, C. A., by
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S. A., Guatemala.
PBX: (502) 6628-1100 · sac@pharmalat.net
www.pharmalat.net

