



Depotrex[®]

Dexketoprofeno

Su médico le ha recetado **Depotrex[®]**, producto cuyas fórmulas contienen:

	Cada tableta recubierta	Solución oral
Dexketoprofeno Trometamol equivalente a Dexketoprofeno	25 mg	25 mg/10 mL
Excipientes o vehículo c.s.p.	1 tableta	1 sobre

¿Qué es Depotrex[®]? Contiene como principio activo Dexketoprofeno Trometamol, un analgésico antiinflamatorio no esteroideo perteneciente a la clase de los derivados de Ácido Propiónico, ampliamente usados a través de los años, ejerce su acción analgésica y antiinflamatoria por medio de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, esto lo logra al inhibir las enzimas ciclooxigenasa 1 (COX1) y ciclooxigenasa 2 (COX2).

Lea todo el prospecto detenidamente antes de tomar el medicamento:

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tenga los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

¿Para qué se utiliza Depotrex[®]? Su médico le ha recetado **Depotrex[®]**, para el alivio sintomático del dolor de intensidad leve a moderada, como dolor músculo-esquelético, dolor de las articulaciones, dismenorrea y dolor dental.

¿Cuáles son las precauciones de Depotrex[®]? La seguridad del uso de este medicamento en niños aún no ha sido establecida. Administrar con precaución en pacientes con historial de condiciones alérgicas y/o asma. Los AINE's deben utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera péptica. Todos los AINE's, pueden inhibir la agregación plaquetaria y pueden aumentar el tiempo de coagulación por inhibición de la síntesis de prostaglandinas, de esa razón los pacientes que reciban otras terapias que puedan alterar la hemostasia tal como warfarina u otros medicamentos cumarínicos o heparina han de ser cuidadosamente monitoreados si se administra **Depotrex[®]**. Otras precauciones generales que deben de

observarse son valorar su empleo en pacientes con trastornos funcionales renales, hepáticos o cardíacos. Deben monitorearse a los pacientes sometidos al tratamiento con algún AINE's para controlar la aparición de trastornos hematológicos, renales, hepáticos u oculares. Utilizar AINE's con precaución en pacientes que presentan infecciones, pues pueden enmascarar síntomas como la fiebre y la inflamación.

El uso de AINES durante los últimos 3 meses de embarazo puede causar problemas renales poco frecuentes pero graves en el feto.

¿Cuáles son las contraindicaciones de Depotrex®? No debe administrarse en los siguientes casos:

- Durante el embarazo y lactancia.
- Pacientes con insuficiencia hepática, renal y/o cardíaca de moderada a grave.
- Hipersensibilidad al Dexametopropeno u otro AINE's con acción similar.
- Pacientes con úlcera gastrointestinal activa o historial de úlcera gastrointestinal.
- Pacientes con hemorragia gastrointestinal.
- Pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.
- Pacientes con historial de asma bronquial.
- Pacientes con insuficiencia cardíaca grave no controlada.
- Pacientes con trastornos de la coagulación (diátesis hemorrágica) y retinopatías diabéticas.

¿Cómo tomar Depotrex®? Adultos habitualmente se recomienda la administración de una tableta (25 mg) cada 8 horas. La dosis diaria no debe exceder 75 mg. Ancianos y pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada o con afección renal leve, debería empezar con una dosis diaria no superior a 50 mg (2 tabletas al día). En caso de dolor agudo se aconseja tomar **Depotrex®** como mínimo media hora antes de las comidas. No presenta interacciones con alimentos y bebidas, se pueden administrar en conjunto.

Vía de administración: Oral.

Presentación tabletas: Caja con 10 tabletas de 25 mg cada una.

Presentación solución oral: Caja con 10, y 50 sobres de 10 mL cada uno.

Fabricado en Guatemala, C.A., por/
Manufactured in Guatemala, C.A., by **Pharmalat**.
0 Ave. "C" 2-55, Col. Najarito, Zona 6 Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat

