

INICIALVIT®



Su médico le ha recetado **Inicialvit®** con la finalidad de prevenir manifestaciones de agotamiento físico o intelectual. La falta de vitaminas es expresada en trastornos orgánico funcionales que desencadenan otras enfermedades especialmente por la falta de vitaminas del complejo "B".

Inicialvit® contiene las vitaminas esenciales para obtener los resultados deseados de manera balanceada.

FÓRMULA: Cada 1 mL contiene:

Vitamina A	3000 UI
Vitamina D3.....	400 UI
Vitamina C	60 mg
Vitamina B1	1 mg
Vitamina B2	1 mg
Vitamina E	1 mg
Niacinamida (Vitamina B3).....	8 mg
Vehículo c.s.p.	1 mL

INDICACIONES: **Inicialvit®**, está indicado en estados carenciales de vitaminas, como en situaciones de dietas inadecuadas, de adelgazamiento, vegetarianas u otras; falta de apetito y convalecencias.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: No tome este medicamento como sustituto de una dieta equilibrada y deberá tener en cuenta otros aportes de vitaminas.

Puede que aparezca un mayor tono amarillento de la orina, sin que interfiera en ninguna función del organismo.

Debe consultar con el médico antes de tomar este medicamento si está en algunos de los siguientes casos: si padece de enfermedad del riñón, del corazón, predisposición a tener cálculos (piedras), arterioesclerosis o tiene niveles altos de fosfato en sangre, o alguna enfermedad granulomatosa como sarcoidosis (con nódulos, generalmente en la piel).

También debe consultar al médico si está en tratamiento con: medicamentos para el corazón o anticoagulantes (para la circulación).

CONTRAINDICACIONES: Si es alérgico a los principios activos, a los productos derivados de la Vitamina D o cualquier de los demás componentes de este medicamento.

Si padece de enfermedad grave del riñón o del hígado. Si tiene niveles elevados de calcio o de vitamina A o D en sangre o en orina. Si tiene una enfermedad grave de los huesos (osteodistrofia renal). Si padece formación de cálculos (piedras) de calcio en el riñón.

DOSIS: La que el médico indique.

No tomar de forma continuada durante más de 15 días o hasta un mes.

Uso en niños: No administrar a niños menores de 2 años.

Siguiendo las instrucciones de su médico usted obtendrá excelentes resultados en casos de desnutrición y convalecencia, situaciones de estrés, además estas vitaminas son esenciales en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos al actuar como coenzimas.

Fabricado en Guatemala, C.A., por
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.
0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat



Actualizado 17 de enero del 2022