



Simbra®

Norfloxacin/Norfloxacin 400 mg

Su médico le ha recetado **SIMBRA®** para combatir una infección bacteriana que detectó en su organismo, por lo tanto, siga exactamente todas sus instrucciones para obtener los resultados deseados en el menor tiempo posible.

¿CUÁL ES LA FÓRMULA DE SIMBRA®?

Cada tableta contiene:

Norfloxacin..... 400 mg
Excipientes c.s.p..... 1 tableta

¿CUÁL ES EL ESPECTRO DE ACCIÓN DE SIMBRA®? Tiene un amplio espectro de acción contra bacterias patógenas aerobias, tanto grampositivas como gramnegativas incluyendo pseudomonas. Es bactericida porque inhibe la síntesis bacteriana del ácido desoxirribonucleico (ADN) teniendo además a nivel molecular efectos específicos contra Escherichia coli.

¿SE CREA RESISTENCIA BACTERIANA CON SIMBRA®? Las bacterias patógenas han desarrollado resistencia a ella en menos de 1 % de los pacientes tratados, debido a su estructura específica es generalmente activo contra gérmenes resistentes a otros antibióticos.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE SIMBRA®? En infecciones de las vías urinarias superiores o inferiores complicadas o no, agudas o crónicas, por ejemplo: cistitis, pielitis, cistopielitis, pielonefritis, epididimitis, prostatitis crónica, uretritis, proctitis o cervicitis causada por gonococos (gonorreas) productores o no de penicilinasas, gastroenteritis bacteriana aguda, fiebre tifoidea y las asociadas con operaciones urológicas, vejiga neurógena o nefrolitiasis, causadas por bacterias sensibles a **SIMBRA®**.

¿CUÁL ES LA DOSIS DE SIMBRA®? Normalmente el tratamiento con **SIMBRA®** es de 7 días tomándose 1 tableta cada 12 horas (Ejemplo: A las 6 de la mañana y 6 de la tarde). **En infecciones crónicas recurrentes del aparato urinario:** 1 tableta cada 12 horas durante 12 semanas. **En gonorrea aguda:** 2 tabletas en una sola toma. **En fiebre tifoidea:** 1 tableta cada 8 horas durante 14 días. Las dosificaciones anteriores pueden variar de acuerdo al criterio médico y al estado del paciente.





¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE SIMBRA®? Se presenta en caja de 14 tabletas.

¿QUÉ CONTRAINDICACIONES TIENE SIMBRA®? Está contraindicado en pacientes sensibles a la norfloxacin. No se ha determinado la seguridad durante el embarazo por lo que debe compararse los beneficios del tratamiento con sus posibles riesgos. Se debe tener precaución en mujeres lactantes. No se ha determinado la seguridad de **SIMBRA®** en niños, por lo tanto no debería administrarse a pacientes que no han llegado a su pubertad.

¿QUÉ EFECTOS ADVERSOS TIENE SIMBRA®?

Sistema músculo esquelético: Tendinitis, rotura tendinosa, mialgia, debilidad muscular, artralgia y edema articular.

Sistema Nervioso: Neuropatía periférica, psicosis, ansiedad, insomnio, depresión, alucinaciones, pensamientos autolíticos, confusión, alteraciones de la audición o la visión o de los sentidos del gusto y el olfato.

Salud mental: Trastornos de la atención, desorientación, agitación, nerviosismo, alteraciones de la memoria y trastornos graves de las capacidades mentales llamadas delirios.

Siga exactamente todas las instrucciones de su médico, de tal manera que no interrumpa el tratamiento u olvide tomar una sola dosis para obtener a cambio excelentes resultados. La caja de **SIMBRA®** constituye un tratamiento completo, salvo en fiebre tifoidea que son 3 cajas y en infecciones crónicas que son 12 cajas.

Mayor información se la proporcionará su médico quien posee amplios conocimientos farmacológicos y especialmente porque conoce su enfermedad y su estado de salud.

Droguería y Laboratorio Pharmalat, S. A.

0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito

Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

www.pharmalat.net

servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat

