



Pharmalat

Zuvine[®]
ANTIBIÓTICO

Su médico le ha recetado **Zuvine[®]** que en su fórmula contiene:

Cada cápsula:

Cefixima trihidrato equivalente a Cefixima anhidra..... 400 mg

Cada 5 mL de suspensión reconstituida:

Cefixima trihidrato equivalente a Cefixima anhidra..... 100 mg

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE Zuvine[®]?

Zuvine[®] es un tratamiento para las infecciones causadas por organismos sensibles a la cefixima, como la faringitis y amigdalitis (causadas por *S. pyogenes*), bronquitis aguda y episodios de reagudización de bronquitis crónica y neumonías (causadas por *S. pneumoniae* y *H. influenzae*), otitis media (causada por *H. influenzae* y *B. (Moraxella) catarrhalis*, *S. pyogenes* y *S. pneumoniae*) e infecciones de vías urinarias no complicadas (causadas por *E. coli* y *Proteus mirabilis*).

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE Zuvine[®]?

Hipersensibilidad a las cefalosporinas, cefamicinas u otros medicamentos betalactámicos y a cualquiera de los excipientes de la formulación.

¿QUÉ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS TIENE Zuvine[®]?

Tener especial cuidado antes de tomar ZUVINE[®] si padece de asma o si tiene predisposición a manifestaciones alérgicas, si el tratamiento es prolongado puede haber predisposición a infecciones por hongos o bacterias resistentes, si durante el tratamiento apareciera (colitis) diarrea, sangre, moco o pus en las deposiciones, si padeciera de problemas gastrointestinales graves como náuseas y vómitos y si estuviera tomando medicamentos diuréticos y/o medicamentos que pueden ser dañinos para los riñones. Durante el embarazo, en prematuros, recién nacidos y lactantes hasta 6 meses según criterio del médico.

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN DE Zuvine[®]?

Cápsulas: La dosis diaria recomendada en adultos y niños mayores de 12 años o más de 50 kg 1 cápsula cada 24 horas durante 10 días.

Suspensión: Niños: 8 mg/kg/día de peso como dosis única o 4 mg/kg de peso corporal cada 12 horas o según el criterio del médico. La dosis máxima recomendada no debe excederse de 12 mg/kg al día. En casos de insuficiencia renal, con un aclaramiento de creatinina ≤ 20 mL/minuto reducir la dosis a la mitad. En pacientes hemodializados no exceder de 200 mg/día. En casos de insuficiencia hepática y en ancianos no es preciso modificar la dosis.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS DE Zuvine®? En caso de presentarse, pueden detectarse frecuentemente diarrea y heces blandas. Raramente puede presentarse náuseas, vómitos, indigestión, dolores abdominales, urticaria, enrojecimiento de la piel y dolor de cabeza.


¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE Zuvine®?

Caja con 10, 20, 30, 50 y 100 cápsulas en blíster y caja con frasco con polvo para 50 mL de suspensión oral.

¿CUÁL ES EL MODO DE USO DE Zuvine® SUSPENSIÓN?

Agregar agua hervida fría para reconstituir la suspensión hasta la flecha indicativa, agitando fuertemente. Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a una temperatura ambiente y 14 días cuando se almacena entre 2-8°C. Luego de este tiempo, cualquier sobrante debe desecharse.

MODO DE USO DE Zuvine® SUSPENSIÓN



1. Agitar bien la suspensión preparada.
2. Medir la cantidad de suspensión indicada por el médico con la copa o jeringa dosificadora.
3. En caso de utilizar la jeringa retire el tapón perforado del extremo de la jeringa.
4. Acople el mismo en la boca del frasco y presione hasta que encaje totalmente.
5. Introduzca el dosificador oral en el orificio del tapón perforado.
6. Invertiendo el frasco, retire con el dosificador oral la cantidad del producto hasta alcanzar la marca del dosificador según le haya indicado su médico o que coincida con mg/Kg de peso corporal del niño según prescripción.
7. Vacíe el contenido del dosificador en la boca del niño.
8. Cierre el frasco con la tapa original sin retirar el tapón perforado.
9. Separe los componentes de la jeringa, y lave por fuera y por dentro con abundante agua.

**SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO
Y OBTENDRÁ A CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.**

Fabricado por/Manufactured by Wexford Laboratories Pvt.
Ltd. India, para/for **Pharmalat, S.A., Guatemala**

0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

www.pharmalat.net • contacto@pharmalat.net

